

**Yazım Kuralları Ek 1**  
**Resimli Türkiye Florası**  
**Alem ilâ Familya arasındaki kategoriler için izlenecek sıra**

**CİLT 2 – 393 tür (Lycopodiophyta—Liliaceae)**

**1- Divisio: Lycophyta / Kibritotu Bölümü**

**1.1- Subdivisio: Lycopodiophytina / Kibritotu Altbölümü**

**1.1.1- Classis: Lycopsidea / Kibritotu Sınıfı**

**1.1.1.1- Subclass Lycopodiidae Bek., Kurs Bot. 1: 115 (1863). / Kibritotu Altsınıfı (3 cins + 13 tür)**

**1.1.1.1.1- Ordo Lycopodiales DC. ex Bercht. & J.Presl, Přir. Rostlin: 272 (1820). / Kibritotu Takımı**

**1.1.1.1.1.1- Lycopodiaceae P.Beauv. ex Mirb. in Lam. & Mirb., Hist. Nat. Vég. 4: 293 (1802). / Kibritotugiller (3 cins + 6 tür)**

**1.1.1.1.2- Ordo Isoëtales Prantl, Lehrb. Bot.: 116 (1874). / Çimeğreltisi Takımı**

**1.1.1.1.2.2- Isoëtaceae Rchb., Bot. Damen: 309 (1828). / Çimeğreltisigiller (1 cins + 5 tür)**

**1.1.1.1.3- Ordo Selaginellales Prantl, Lehrb. Bot.: 116 (1874). / Selagin Takımı**

**1.1.1.1.3.3- Selaginellaceae Willk., Anleit. Stud. Bot. 2: 163 (1854). / Selagingiller (1 cins + 2 tür)**

**2- Divisio: Pteridophyta / Eğrelti Bölümü (32 cins + 102 tür [12 melez] + 6 alttür + 3 varyete)**

**2.2- Subdivisio: Equisetophytina. / Atkuyruğu Altbölümü (1 cins + 9 tür [1 melez])**

**2.2.2- Classis: Equisetopsida. / Atkuyruğu Sınıfı**

**2.2.2.2- Subclass Equisetidae Warm., Osnov. Bot.: 221 (1883). Atkuyruğu Altsınıfı (1 cins + 9 tür [1 melez])**

**2.2.2.2.4- Ordo Equisetales DC. ex Bercht. & J.Presl, Přir. Rostlin: 271 (1820). Atkuyruğu Takımı**

**2.2.2.2.4.4- Equisetaceae Michx. ex DC., Essai Propr. Méd. Pl.: 49 (1804). / Atkuyruğugiller (1 cins + 9 tür [1 melez])**

**2.3- Subdivisio: Ophioglossophytina. / Dilotu Altbölümü (2 cins + 3 tür)**

**2.3.3- Classis: Ophioglossopsida / Dilotu Sınıfı**

**2.3.3.3- Subclass Ophioglossidae Klinge, Fl. Est.-Liv-Churland 1: 94 (1882). / Dilotu Altsınıfı (2 cins + 3 tür)**

**2.3.3.3.5- Ordo: Ophioglossales. / Dilotu Takımı.**

**2.3.3.3.5.5- Ophioglossaceae Martinov, Tekhno-Bot. Slovar: 438 (1820). Dilotugiller (2 cins + 3 tür)**

*Botrychiaceae* Horan.

**2.4- Subdivisio: Pteridophytina. / Eğrelti Altbölümü (26 cins + 80 tür [11 melez] + 6 alttür + 3 varyete)**

**2.4.4- Classis: Pteridopsida. / Eğrelti Altsınıfı**

**2.4.4.4- Subclass: Polypodiidae Cronquist, Takht. & Zimmerm., Taxon 15: 133 (1966). / Eğrelti Altsınıfı (26 cins + 77 tür [11 melez] + 6 alttür + 3 varyete)**

**2.4.4.4.6- Ordo Osmundales Link, Hort. Berol. 2: 138 (1833). / Kıraleğreltisi Takımı**

**2.4.4.4.6.6- Osmundaceae Martinov, Tekhno-Bot. Slovar: 445 (1820). / Kıraleğreltisigiller (1 cins + 1 tür)**

**2.4.4.4.7- Ordo Hymenophyllales A.B.Frank in J.Leunis, Syn. Pflanzenk., ed. 2, 3: 1452 (1877). / Zareğreltisi Takımı.**

**2.4.4.4.7.7- Hymenophyllaceae Mart., Consp. Regni Veg.: 3 (1835). / Zareğreltigiller (1 cins + 1 tür)**

**2.4.4.4.8- Ordo Salviniales Bartl. in Mart., Consp. Regn. Veg.: 4 (1835). / Sueğreltisi Takımı.**

**2.4.4.4.8.8- Marsileaceae Mirb. in Lam. & Mirb., Hist. Nat. Vég. 5: 126 (1802). / Sutrifilgiller (2 cins + 3 tür)**

**2.4.4.4.8.9- Salviniaceae Martinov, Tekhno-Bot. Slovar: 559 (1820). / Sueğreltisigiller (2 cins + 2 tür)**

*Azollaceae* Wettst.

**2.4.4.4.9- Ordo Polypodiales Link, Hort. Berol. 2: 5 (1833). / Eğrelti Takımı.**

*Filicales* Dumortier, [yasd. ad / nom. illeg.]

**2.4.4.4.9.10- Dennstaedtiaceae Lotsy, Vortr. Bot. Stammesgesch. 2: 655 (1909). / Eğreltigiller (1 cins + 1 tür)**

*Hypolepidaceae* Pic.Serm.; *Pteridiaceae* Ching

**2.4.4.4.8.11- Pteridaceae E.D.M.Kirchn., Schul-Bot.: 109 (1831). / Baldırkaragiller (6 cins + 12 tür)**

Sinonim: *Adiantaceae* Newman; *Sinopteridaceae* Koidz.; *Cryptogrammeae* Pic.Serm.; *Cheilantheae* B.K.Nayar, *Taxon* 19: 233 (1970).

Subfamily 31a. *Cryptogrammoideae* S.Linds. *Edinburgh J. Bot.* 66(2): 358. 2009

Subfamily 31c. *Pteridoideae* C.Chr. ex Crabbe, Jermy & Mickel, *Fern Gaz.* 11: 153 (1975).

Subfamily 31d. *Cheilantheoideae* W.C.Shieh, *J. Sci. Engin. (Nation. Chung-Hsing Univ.)* 10: 211 (1973).

Subfamily 31e. *Vittarioideae* (C.Presl) Crabbe, Jermy & Mickel, *Fern Gaz.* 11: 154 (1975). Sinonim:

*Adiantoideae* (C.Presl) R.M.Tryon, *Amer. Fern J.* 76: 184 (1986).

**2.4.4.4.8.12- Cystopteridaceae** Schmakov, *Turczaninowia* 4: 60 (2001). / **Gevrekeğreltigiller (2 cins + 4 tür)**

**2.4.4.4.8.13- Aspleniaceae** Newman, *Hist. Brit. Ferns*: 6 (1840). / **Saçakotugiller (1 cins + 19 tür [3 melez])**

**2.4.4.4.8.14- Thelypteridaceae** Pic.Serm., *Webbia* 24: 709 (1970). / **İfterigiller (3 cins + 3 tür)**

**2.4.4.4.8.15- Woodsiaceae** Herter, *Rev. Sudamer. Bot.* 9: 14 (1949). / **Yaylaeğreltisigiller (1 cins + 1 tür)**

**2.4.4.4.8.16- Onocleaceae** Pic.Serm., *Webbia* 24: 708 (1970). / **Şaheğreltisigiller (1 cins + 1 tür)**

1(-4) genera: (*Onoclea*). Reference: Gastony & Ungerer (1997).

Note:—The four genera (*Matteuccia*, *Onoclea*, *Onocleopsis* and *Pentarhizidium*) are very close and are here treated under the single genus *Onoclea*.

**2.4.4.4.8.17- Blechnaceae** Newman, *Hist. Brit. Ferns*, ed. 2: 8 (1844). / **Tarakeğreltisigiller (1 cins + 1 tür)**

**2.4.4.4.8.18- Athyriaceae** Alston, *Taxon* 5: 25 (1956). / **Yeleşreltisigiller (1 cins + 2 tür)**

**2.4.4.4.8.19- Dryopteridaceae** Herter, *Rev. Sudamer. Bot.* 9: 15 (1949). / **Pilunçgiller (2 cins + 22 tür [6 melez] + 6 alttür + 1 varyete)**

Sinonim: *Aspidiaceae* Mett. ex A.B.Frank; *Filicaceae* Juss.

Subfamily 42a. *Dryopteridoideae* B.K.Nayar, *Taxon* 19: 235 (1970).

**2.4.4.4.8.20- Polypodiaceae** J.Presl & C.Presl, *Delic. Prag.*: 159 (1822). / **Benlieğreltigiller (1 cins + 4 tür [2 melez] + 2 varyete)**

Subfamily 48e. *Polypodioidae* B.K.Nayar, *Taxon* 19: 234 (1970).

**3- Divisio: Magnoliophyta / Tohumlu Bitkiler Bölümü (00 cins + 00 tür [00 melez] + 00 alttür + 00 varyete)**

**3.5- Subdivisio: Pinophytina. / Açıktohumlular Altbölümü**

**3.5.5- Classis: Cycadopsida / Sikas Sınıfı**

**3.5.5.5- Subclass CYCADIDAE** Pax in K.A.E.Prantl, *Lehrb. Bot.* ed. 9: 203 (1894).

**3.5.5.5.10- Ordo CYCADALES** Pers. ex Bercht. & J.Presl, *Pfir. Rostlin*: 262 (1820).—T.: Cycadaceae.

**3.5.6- Classis: Ginkgopsida / Ginko Sınıfı**

**3.5.6.6- Subclass GINKGOIDAE** Engl. in H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl, *Nat. Pflanzenfam. Nacht.*: 341 (1897).

**3.5.6.6.11- Ordo GINKGOALES** Gorozh., *Lekts. Morf. Sist. Archegon.*: 73 (1904).  
**Ginkgoaceae**

**3.5.7- Classis: Gnetopsida / Denizüzümü Sınıfı**

**3.5.7.7- Subclass GNETIDAE** Pax in K.A.E. Prantl, *Lehrb. Bot.*, ed. 9: 203 (1894).

**3.5.7.7.12- Ordo EPHEDRALES** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 11 (1829).

**3.5.7.7.12.21- Ephedraceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 11 (1829), *nom. cons.*

**3.5.8- Classis: Pinopsida / Çam Sınıfı**

**3.5.8.8- Subclass PINIDAE** Cronquist, Takht. & Zimmerm., *Taxon* 15: 134 (1966).

**3.5.8.8.13- Ordo PINALES** Gorozh., *Lekts. Morf. Sist. Archegon.*: 88 (1904).

**3.5.8.8.13.22- Pinaceae** Spreng. ex F.Rudolphi, *Syst. Orb. Veg.*: 35 (1830), *nom. cons.*

**3.5.8.8.14- Ordo CUPRESSALES** Link, *Handbuch* 2: 470 (1829).

**3.5.8.8.14.23- Cupressaceae** Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 222. (1822), *nom. cons.*

*Cryptomeriaceae* Gorozh.

**3.5.8.8.14.24- Taxaceae** Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 222, 226 (1822), *nom. cons.*

**3.6- Subdivisio: Magnoliophytina. / Kapalıtohumlular Altbölümü**

**3.6.9- Classis: Magnoliopsida / Manolya Sınıfı**

**3.6.9.9- Superordo Nymphaeanae** Thorne ex Reveal, *Novon* 2: 236. 13 Oct 1992.

**3.6.9.9.15- Ordo Nymphaeales** Salisb. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 270. Jan–Apr 1820.

**3.6.9.9.15.25- Nymphaeaceae** Salisb., *Ann. Bot. (König & Sims)* 2: 70. Jun 1805, *nom. cons.*

**3.6.9.10- Superordo Magnolianae** Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 51. 4 Feb 1967

**3.6.9.10.16- Ordo Piperales** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 261. Jan–Apr 1820

**3.6.9.10.16.26- Aristolochiaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 72. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**3.6.9.10.17- Ordo Magnoliales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 223. Jan–Apr 1820

**3.6.9.10.16.27- Magnoliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 280. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**3.6.9.10.18- Ordo Laurales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 235. Jan–Apr 1820

**3.6.9.10.16.28- Lauraceae** Juss., *Gen. Pl.*: 80. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

- 3.6.9.11- Superordo **Liliana**e Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 473. 4 Feb 1967  
 3.6.9.11.19- Ordo **Acorales** Mart., *Consp. Regn. Veg.*: 6. Sep–Oct 1835  
 3.6.9.11.19.29- **Acoraceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 6. 3 Aug 1820  
 3.6.9.11.20- Ordo **Alismatales** R.Br. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 271. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.11.20.30- **Araceae** Juss., *Gen. Pl.*: 23. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Lemnaceae* Gray, [*kor. ad / nom. cons.*].  
 3.6.9.11.20.31- **Alismataceae** Vent., *Tabl. Règne Vég.* 2: 157. 5 Mai 1799, *nom. cons.*  
*Limnocharitaceae* Takht. ex Cronquist  
 3.6.9.11.20.32- **Butomaceae** Mirb., *Hist. Nat. Pl.* 8: 194. 1804, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.20.33- **Hydrocharitaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 67. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Najadaceae* Juss., *nom. cons.*; *Vallisneriaceae* Dumort.,  
 3.6.9.11.20.34- **Juncaginaceae** Rich., *Démonstr. Bot.*: ix. Mai 1808, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.20.35- **Zosteraceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 65, 66. 1829, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.20.36- **Potamogetonaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin* 1(7\*–13): 1, 3. 1823, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.20.37- **Posidoniaceae** Vines, *Stud. Text-book Bot.* 2: 553. Mar 1895, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.20.38- **Ruppiaceae** Horan., *Prim. Lin. Syst. Nat.*: 46. 2 Nov 1834, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.20.39- **Cymodoceaceae** Vines, *Stud. Text-book Bot.* 2: 553. Mar 1895, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.21- Ordo **Dioscoreales** Mart., *Consp. Regn. Veg.*: 9. Sep–Oct 1835  
 3.6.9.11.21.40- **Nartheciaceae** Fr. ex Bjurzon, *Skandin. Växtfam.*: 64. 1846  
 3.6.9.11.21.41- **Dioscoreaceae** R.Br., *Prodr.*: 294. 27 Mar 1810, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.22- Ordo **Liliales** Perleb, *Lehrb. Naturgesch. Pflanzenr.*: 129. Sep–Oct 1826  
 3.6.9.11.22.42- **Melanthiaceae** Batsch ex Borkh., *Bot. Wörterb.* 2: 8. 1797, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.22.43- **Colchicaceae** DC., *Essai Propr. Méd. Pl.*: 56. Jul 1804, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.22.44- **Smilacaceae** Vent., *Tabl. Règne Vég.* 2: 146. 5 Mai 1799, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.22.45- **Liliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 48. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.23- Ordo **Asparagales** Link, *Handbuch* 1: 272. 4–11 Jul 1829

## CİLT 3 – 454 tür (Orchidaceae—Amaryllidaceae)

- 3.6.9.11.23.46- **Orchidaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 64. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.23.47- **Ixiolirionaceae** Nakai, *Chosakuronbun Mokuroku [Ord. Fam. Trib. Nov.]*: 234. 20 Jul 1943  
 3.6.9.11.23.48- **Iridaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 57. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.23.49- **Xanthorrhoeaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 60, 62, 103. 1829, *nom. cons.*  
*Asphodelaceae* Juss.  
 3.6.9.11.23.50- **Amaryllidaceae** J.St.-Hill., *Expos. Fam. Nat.* 1: 134. Feb–Apr 1805, *nom. cons.*

## CİLT 4 – 424 tür (Asparagaceae—Cyperaceae)

- 3.6.9.11.23.51- **Asparagaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 40. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Hyacinthaceae* Batsch ex Borkh.  
 3.6.9.11.24- Ordo **Arecales** Bromhead, *Mag. Nat. Hist.*, n.s., 4: 333. Jul 1840  
 3.6.9.11.24.52- **Arecaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 266. Jan–Apr 1820, *nom. cons.*, *nom. alt.*  
*Palmae* Juss., *Gen. Pl.*: 37. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.25- Ordo **Commelinales** Mirb. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 267. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.11.25.53A- **Commelinaceae** Mirb., *Hist. Nat. Pl.* 8: 177. 1804, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.25.53B- **Pontederiaceae** Kunth in F.W.H.A. von Humboldt, A.J.A. Bonpland & C.S. Kunth, *Nov. Gen. Sp.* 1, ed. qu.: 265.4–11 Mai 1816, *nom. cons.*  
*Heteranthaceae* J. Agardh  
 3.6.9.11.26- Ordo **Zingiberales** Griseb., *Grundr. Syst. Bot.*: 167. 1–2 Jun 1854  
 3.6.9.11.26.54- **Musaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 61. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.26.55- **Cannaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 62. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.27- Ordo **Poales** Small, *Fl. S.E. U.S.*: 48. 22 Jul 1903  
 3.6.9.11.27.56- **Typhaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 25. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Sparganiaceae* Hanin, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.27.57- **Juncaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 43. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.11.27.58- **Cyperaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 26. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

## Cilt 5 ve 6 = 553 tür (Poaceae)

- 3.6.9.11.27.59- **Poaceae** Barnhart, *Bull. Torrey Bot. Club* 22: 7. 15 Jan 1895, *nom. cons.*, *nom. alt.*  
*Gramineae* Juss., *nom. cons.*

## Cilt 7 = 427 tür (Ceratophyllaceae—Haloragaceae)

- 3.6.9.12- Superordo **Ceratophyllanae** Takht. ex Reveal & Doweld, *Novon* 9: 549. 30 Dec 1999  
 3.6.9.12.28- Ordo **Ceratophyllales** Link, *Handbuch* 2: 406. 4–11 Jul 1829

- 3.6.9.12.28.60- **Ceratophyllaceae** Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 395, 554. 10 Jan 1822, *nom. cons.*  
 3.6.9.13- Superordo **Ranunculanae** Takht. ex Reveal, *Novon* 2: 236. 13 Oct 1992  
 3.6.9.13.29- Ordo **Ranunculales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 215. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.13.29.61- **Papaveraceae** Juss., *Gen. Pl.*: 235. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.13.29.62- **Berberidaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 286. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.13.29.63- **Ranunculaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 231. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.14- Superordo **Proteanae** Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 401. 4 Feb 1967  
 3.6.9.14.30- Ordo **Proteales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 234. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.14.30.64- **Platanaceae** T.Lestib., *Botanogr. Elém.*: 526. 12–19 Jun 1826, *nom. cons.*  
 3.6.9.15- Superordo **Buxanae** Takht. ex Reveal & Doweld, *Novon* 9: 549. 30 Dec 1999  
 3.6.9.15.31- Ordo **Buxales** Takht. ex Reveal, *Phytologia* 79: 72. 29 Apr 1996  
 3.6.9.15.31.65- **Buxaceae** Dumort., *Comment. Bot.*: 54. Nov–Dec 1822, *nom. cons.*  
 3.6.9.16- Superordo **Saxifraganae** Reveal, *Phytologia* 76: 4. 2 Mai 1994  
 3.6.9.16.32- Ordo **Saxifragales** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 259. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.16.32.66- **Paeniaceae** Raf., *Anal. Nat.*: 176. Apr–Jul 1815, *nom. cons.*  
 3.6.9.16.32.67- **Altingiaceae** Horan., *Osnov. Bot.*: 271. 1841, *nom. cons.*  
 3.6.9.16.32.68- **Grossulariaceae** DC. in J.B.A.P.M. de Lamarck & A.P. de Candolle, *Fl. Franç.*, ed. 3, 4(2): 405. 17 Sep 1805, *nom. cons.*  
 3.6.9.16.32.69- **Saxifragaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 308. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.16.32.70- **Crassulaceae** J.St.-Hil., *Expos. Fam. Nat.* 2: 123. Feb–Apr 1805, *nom. cons.*  
 3.6.9.16.32.71- **Haloragaceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 549. 19 Jul 1814, *nom. cons.*

## Cilt 8, 9, 10 = 1341 tür (Vitaceae–Fabaceae [kismen 1/3]–Rosaceae)

- 3.6.9.17- Superordo **Rosanae** Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 264. 4 Feb 1967  
 3.6.9.17.33- Ordo **Vitales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 225. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.17.33.72- **Vitaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 267. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.34- Ordo **Zygophyllales** Link, *Handbuch* 2: 228. 4–11 Jul 1829  
 3.6.9.17.34.73- **Zygophyllaceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 545. 19 Jul 1814, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.35- Ordo **Fabales** Bromhead, *Edinburgh New Philos. J.* 25: 126. Jul 1838  
 3.6.9.17.35.74- **Fabaceae** Lindl., *Edwards's Bot. Reg.* 22: ad t. 1845. 1 Apr 1836, *nom. cons.*, *nom. alt.*  
 Sinonim: *Caesalpinaceae* R.Br., *nom. cons.*; *Leguminosae* Juss., *nom. cons.*; *Mimosaceae* R.Br., *nom. cons.*; *Papilionaceae* Giseke, *nom. cons.*, *nom. alt.*

## Cilt 11 = 406 tür (Polygalaceae–Urticaceae)

- 3.6.9.17.35.75- **Polygalaceae** Hoffmanns. & Link, *Fl. Portug.* 1: 62. 1 Sep 1809, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.36- Ordo **Rosales** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 231. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.17.36.76- **Rosaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 334. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.36.77- **Elaeagnaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 74. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.36.78- **Rhamnaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 376. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.36.79- **Ulmaceae** Mirb., *Elém. Physiol. Vég. Bot.* 2: 905. 24–30 Jun 1815, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.36.80- **Cannabaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 99. 3 Aug 1820, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.36.81- **Moraceae** Gaudich. in C. B. Trinius, *Gen. Pl.*: 13. 1835, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.36.82- **Urticaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 400. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

## Cilt 12 = 406 tür (Fagaceae–Hypericaceae)

- 3.6.9.17.37- Ordo **Fagales** Engl., *Syllabus*, ed. 1: 94. Apr 1892  
 3.6.9.17.37.83- **Fagaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 11, 12. 1829, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.37.84- **Juglandaceae** DC. ex Perleb, *Vers. Arzneikr. Pfl.*: 143. Mai 1818, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.37.85- **Casuarinaceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 571. 19 Jul 1814, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.37.86- **Betulaceae** Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 222, 243. 10 Jan 1822, *nom. cons.*  
 Sin.: *Carpinaceae* Vest; *Corylaceae* Mirb., *nom. cons.*  
 3.6.9.17.38- Ordo **Cucurbitales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 236. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.17.38.87- **Apodanthaceae** Tiegh. ex Takht., *Sist. Magnolioph. [Syst. Magnolioph.]*: 42. 24 Jun 1987  
 3.6.9.17.38.88- **Cucurbitaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 393. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.38.89- **Datisceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 13, 14. 1829, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.39- Ordo **Celastrales** Link, *Handbuch* 2: 115. 4–11 Jul 1829  
 3.6.9.17.39.90- **Celastraceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 554. 19 Jul 1814, *nom. cons.*  
*Parnassiaceae* Martinov, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.40- Ordo **Oxalidales** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 221. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.17.40.91- **Oxalidaceae** R.Br. in J.H. Tuckey, *Narr. Exped. Zaire*: 433. 5 Mar 1818, *nom. cons.*

- 3.6.9.17.41- Ordo **Malpighiales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 225. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.17.41.92- **Euphorbiaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 384. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.41.93- **Phyllanthaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 369. 3 Aug 1820, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.41.94- **Elatinaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 44, 49. 1829, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.41.95- ??? **Passifloraceae** Juss. ex Roussel, *Fl. Calvados*, ed. 2: 334. 30 Mai 1806, *nom. cons. ???*  
 3.6.9.17.41.96- **Salicaceae** Mirb., *Elém. Physiol. Vég. Bot.* 2: 905. 24–30 Jun 1815, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.41.97- **Violaceae** Batsch, *Tab. Affin. Regni Veg.*: 57. 2 Mai 1802, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.41.98- **Linaceae** DC. ex Perleb, *Vers. Arzneikr. Pfl.*: 107. Mai 1818, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.41.99- **Hypericaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 254. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

## Cilt 13 = 306 tür (Geraniaceae—Cleomaceae)

- 3.6.9.17.42- Ordo **Geraniales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 221. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.17.42.100- **Geraniaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 268. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.43- Ordo **Myrtales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 233. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.17.43.101- **Lythraceae** J.St.-Hil., *Expos. Fam. Nat.* 2: 175. Feb–Apr 1805, *nom. cons.*  
*Punicaceae* Bercht. & J.Presl, 1825, *nom. cons.*; *Trapaceae* Dumort., *nom. cons.*  
 3.6.9.17.43.102- **Onagraceae** Juss., *Gen. Pl.*: 317. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.43.103- **Myrtaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 322. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.43.104- **Staphyleaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 598. 3 Aug 1820, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.44- Ordo **Sapindales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 224. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.17.44.105- **Biebersteiniaceae** Schnizl., *Anal. Nat. Ordn. Gew.*: 14. 1856  
 3.6.9.17.44.106- **Nitrariaceae** Lindl., *Intr. Nat. Syst. Bot.*: 149. 27 Sep 1830  
 3.6.9.17.44.107- **Anacardiaceae** R.Br. in J.H. Tuckey, *Narr. Exped. Zaire*: 431. 5 Mar 1818, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.44.108- **Sapindaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 246. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Aceraceae* Juss., *nom. cons.*; *Hippocastanaceae* A.Rich., *nom. cons.*  
 3.6.9.17.44.109- **Rutaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 296. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.44.110- **Simaroubaceae** DC., *Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris* 2: 209. Jan 1811, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.44.111- **Meliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 263. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.45- Ordo **Malvales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 221. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.17.45.112- **Cytinaceae** A.Rich. in J.B.G.M. Bory de Saint-Vincent, *Dict. Class. Hist. Nat.* 5: 301. 15  
 Mai 1824  
 3.6.9.17.45.113- **Malvaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 271. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Tiliaceae* Juss., *nom. cons.*  
 3.6.9.17.45.114- **Thymelaeaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 76. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.45.115- **Cistaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 294. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.46- Ordo **Brassicales** Bromhead, *Edinburgh New Philos. J.* 24: 416. Apr 1838  
 3.6.9.17.46.116- **Resedaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 541. 3 Aug 1820, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.46.117- **Capparaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 242. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.17.46.118- **Cleomaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin* 2(64): 253. 1825

## Cilt 14, 15 = 604 tür (Brassicaceae)

- 3.6.9.17.46.119- **Brassicaceae** Burnett, *Outl. Bot.*: 854, 1093, 1123. Feb 1835, *nom. cons., nom. alt.*  
*Cruciferae* Juss., *nom. cons.*

## Cilt 16 = 209 tür (Santalaceae—Droseraceae)

- 3.6.9.18- Superordo **Santalanae** Thorne ex Reveal, *Novon* 2: 236. 13 Oct 1992  
 3.6.9.18.47- Ordo **Santalales** R.Br. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 234. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.18.47.120- **Santalaceae** R.Br., *Prodr.*: 350. 27 Mar 1810, *nom. cons.*  
 3.6.9.18.47.121- **Loranthaceae** Juss., *Ann. Mus. Natl. Hist. Nat.* 12: 292. 1808, *nom. cons.*  
 3.6.9.19- Superordo **Caryophyllanae** Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 144. 4 Feb 1967  
 3.6.9.19.48- Ordo **Caryophyllales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 239. Jan–Apr 1820  
 3.6.9.19.48.122- **Frankeniaceae** Desv. in S. Gérardin de Mirecourt & N.A. Desvaux, *Dict. Rais. Bot.*: 188.  
 12–19 Apr 1817, *nom. cons.*  
 3.6.9.19.48.123- **Tamaricaceae** Link, *Enum. Hort. Berol. Alt.* 1: 291. 16 Mar–30 Jun 1821, *nom. cons.*  
 3.6.9.19.48.124- **Plumbaginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 92. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.19.48.125- **Polygonaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 82. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
 3.6.9.19.48.126- **Droseraceae** Salisb., *Parad. Lond.* 2: ad t. 95. 1 Feb 1808, *nom. cons.*

## Cilt 17, 18 = 716 tür (Caryophyllaceae—Cactaceae)

- 3.6.9.19.48.127- **Caryophyllaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 299. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Illecebraceae* R.Br., *nom. cons.*  
 3.6.9.19.48.128- **Amaranthaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 87. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

*Chenopodiaceae* Vent., *nom. cons.*

- 3.6.9.19.48.129- **Aizoaceae** Martinov, *Tekno-Bot. Slovar*: 15. 3 Aug 1820, *nom. cons.*  
3.6.9.19.48.130- **Phytolaccaceae** R.Br. in J.H. Tuckey, *Narr. Exped. Zaire*: 454. 5 Mar 1818, *nom. cons.*  
3.6.9.19.48.131- **Nyctaginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 90. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
3.6.9.19.48.132- **Molluginaceae** Bartl. in F.G. Bartling & H.L. Wendland, *Beitr. Bot.* 2: 158. Dec 1825, *nom. cons.*  
*Telephiaceae* Martinov  
3.6.9.19.48.133- **Montiaceae** Raf., *Ann. Gén. Sci. Phys. Bruxelles* 5: 349. Jul–Sep 1820  
3.6.9.19.48.134- **Portulacaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 312. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
3.6.9.19.48.135- **Cactaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 310. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

## Cilt 19 = 313 tür (Cornaceae—Apocynaceae)

- 3.6.9.20- Superordo **Asteranae** Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 451. 4 Feb 1967  
3.6.9.20.49- Ordo **Cornales** Link, *Handbuch* 2: 2. 4–11 Jul 1829  
3.6.9.20.49.136- **Cornaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin* 2(23\*): 91, 92. 1825, *nom. cons.*  
3.6.9.20.49.137- **Hydrangeaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 36, 38. 1829, *nom. cons.*  
3.6.9.20.50- Ordo **Ericales** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 251. Jan–Apr 1820  
3.6.9.20.50.138- **Balsaminaceae** A.Rich. in J.B.G.M. Bory de Saint-Vincent, *Dict. Class. Hist. Nat.* 2: 173. 31 Dec 1822, *nom. cons.*  
3.6.9.20.50.139- **Polemoniaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 136. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
3.6.9.20.50.140- **Ebenaceae** Gürke in H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl, *Nat. Pflanzenfam.* IV, 1: 153. Dec 1892, *nom. cons.*  
3.6.9.20.50.141- **Primulaceae** Batsch ex Borkh., *Bot. Wörterb.* 2: 240. 1797, *nom. cons.*  
3.6.9.20.50.142- **Theaceae** Mirb. ex Ker Gawl., *Bot. Reg.* 2: ad t. 112. 1 Mai 1816, *nom. cons.*  
*Camelliaceae* DC., 1816  
3.6.9.20.50.143- **Styracaceae** DC. & Spreng. [transl. Jameson], *Elem. Philos. Pl.*: 140. Jul 1821, *nom. cons.*  
3.6.9.20.50.144- ??? **Actinidiaceae** Engl. & Gilg, *Syllabus*, ed. 9–10: 279. 6 Nov 1924, *nom. cons.* ???  
3.6.9.20.50.145- **Ericaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 159. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Empetraceae* Hook. & Lindl., *nom. cons.*; *Monotropaceae* Nutt., *nom. cons.*; *Pyrolaceae* Lindl., *nom. cons.*  
3.6.9.20.51- Ordo 57. **Gentianales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 248. Jan–Apr 1820  
3.6.9.20.51.146- **Rubiaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 196. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Theligonaceae* Dumort., *nom. cons.*  
3.6.9.20.51.147- **Gentianaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 141. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
3.6.9.20.51.148- **Apocynaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 143. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Asclepiadaceae* Borkh., *nom. cons.*

## Cilt 20 = 343 tür (Boraginaceae)

- 3.6.9.20.52- Ordo **Boraginales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 244. Jan–Apr 1820 [Note: in Chase & Reveal (2009)]  
3.6.9.20.52.149- **Boraginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 128. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
Sin.: *Hydrophyllaceae* R.Br., [kor. ad / *nom. cons.*].

## Cilt 21 = 302 tür (Convolvulaceae—Plantaginaceae)

- 3.6.9.20.53- Ordo **Solanales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 243. Jan–Apr 1820  
3.6.9.20.53.150- **Convolvulaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 132. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Cuscutaceae* Dumort., *nom. cons.*  
3.6.9.20.53.151- **Solanaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 124. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
3.6.9.20.54- Ordo **Lamiales** Bromhead, *Mag. Nat. Hist.*, ser. 2, 2: 210. Apr 1838  
3.6.9.20.54.152- **Oleaceae** Hoffmanns. & Link, *Fl. Portug.* 1: 62. 1 Sep 1809, *nom. cons.*  
3.6.9.20.54.153- **Plantaginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 89. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Callitrichaceae* Link, *nom. cons.*; *Globulariaceae* DC., *nom. cons.*; *Hippuridaceae* Vest, *nom. cons.*

## Cilt 22 = 410 tür (Scrophulariaceae—Pedaliaceae)

- 3.6.9.20.54.154- **Scrophulariaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 117. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Buddlejaceae* K.Wilh., *nom. cons.*  
3.6.9.20.54.155- **Linderniaceae** Borsch, K.Müll. & Eb.Fisch., *Pl. Biol. (Stuttgart)* 7: 76. 28 Jan 2005  
3.6.9.20.54.156- **Pedaliaceae** R.Br., *Prodr.*: 519. 27 Mar 1810, *nom. cons.*

## Cilt 23, 24 = 714 tür (Lamiaceae—Aquifoliaceae)

- 3.6.9.20.54.157- **Lamiaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 355. 3 Aug 1820, *nom. cons.*, *nom. alt.*  
*Labiatae* Juss., *nom. cons.*
- 3.6.9.20.54.158- **Phrymaceae** Schauer in A.P. de Candolle & A.L.P.P. de Candolle, *Prodr.* 11: 520. 25 Nov 1847, *nom. cons.*
- 3.6.9.20.54.159- ??? **Paulowniaceae** Nakai, *J. Jap. Bot.* 24: 13. Dec 1949 ????
- 3.6.9.20.54.160- **Orobanchaceae** Vent., *Tabl. Règne Vég.* 2: 292. 5 Mai 1799, *nom. cons.*
- 3.6.9.20.54.161- **Lentibulariaceae** Rich. in P.A. Poiteau & P.J.F. Turpin, *Fl. Paris* 1: ed. fol.: 23, ed. qu.: 26. 18 Jan 1808, *nom. cons.*
- 3.6.9.20.54.162- **Acanthaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 102. 4 Aug 1789, *nom. cons.*
- 3.6.9.20.54.163- **Bignoniaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 137. 4 Aug 1789, *nom. cons.*
- 3.6.9.20.54.164- **Verbenaceae** J.St.-Hil., *Expos. Fam. Nat.* 1: 245. Feb–Apr 1805, *nom. cons.*
- 3.6.9.20.55- Ordo **Aquifoliales** Senft, *Lehrb. Forstl. Bot.*: 2: 118. 1856
- 3.6.9.20.55.165- **Aquifoliaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 2(110): 438, 440. 1825, *nom. cons.*

## Cilt 25, 26, 27, 28 = 1486 tür (Campanulaceae—Asteraceae)

- 3.6.9.20.56- Ordo **Asterales** Link, *Handbuch* 1: 731. 4–11 Jul 1829
- 3.6.9.20.56.166- **Campanulaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 163. 4 Aug 1789, *nom. cons.*
- 3.6.9.20.56.167- **Menyanthaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 20, 25. 1829, *nom. cons.*
- 3.6.9.20.56.168- **Asteraceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 254. Jan–Apr 1820, *nom. cons.*, *nom. alt.*  
*Compositae* Giseke, *nom. cons.*

## Cilt 29, 30 = 647 tür (Adoxaceae—Apiaceae)

- 3.6.9.20.57- Ordo **Dipsacales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 255. Jan–Apr 1820
- 3.6.9.20.57.169- **Adoxaceae** E.Mey., *Preuss. Pfl.-Gatt.*: 198. 1–7 Sep 1839, *nom. cons.*  
*Sambucaceae* Batsch ex Borkh., *nom. cons. prop.*; *Viburnaceae* Raf., *nom. cons. prop.*
- 3.6.9.20.57.170- **Caprifoliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 210. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Dipsacaceae* Juss., *nom. cons.*; *Morinaceae* Raf.; *Valerianaceae* Batsch, *nom. cons.*
- 3.6.9.20.58- Ordo **Apiales** Nakai, *Hisi-Shokubutsu*: 58. 1930
- 3.6.9.20.58.171- ????? **Pittosporaceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 542. 19 Jul 1814, *nom. cons.* ?????
- 3.6.9.20.58.172- **Araliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 217. 4 Aug 1789, *nom. cons.*
- 3.6.9.20.58.173- **Apiaceae** Lindl., *Nat. Syst. Bot.*, ed. 2: 21. 13 Jun 1836, *nom. cons.*, *nom. alt.*  
*Umbelliferae* Juss., *nom. cons.*

## LYCOPODIOPHYTA / KİBRİTOTU BÖLÜMÜ

(3 cins + 13 tür)

**Lycopodiophyta** D.H.Scott, *Stud. Foss. Pl.*: 13, 500-501 (1900), [“Lycopodiales“ olarak]. İngilizce bir diyagnoz ile yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Lycopodium* L. (1753). – *Lycopodiaceae*.

**Class/Sınıf: ??????**

Subclass I. **Lycopodiidae** Bek., *Kurs Bot.* 1: 115 (1863).

*Selaginellidae* Knobl. in J.E.B.Warming, *Handb. Syst. Bot.*: 157 (1890).

*Isoëtidae* Reveal, *Phytologia* 79: 70 (1996).

**LYCOPODIIDAE / KİBRİTOTU ALTSINIFI**

(3 cins + 13 tür)

**Lycopodiidae** Bek., *Kurs Bot.* 1: 115 (1863). Rusça bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Lycopodium* L. (1753). – *Lycopodiaceae*.

Order A. **Lycopodiales** DC. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 272 (1820).

**Family 1. Lycopodiaceae** P.Beauv. ex Mirb. in Lam. & Mirb., *Hist. Nat. Vég.* 4: 293 (1802).

**1- LYCOPODIACEAE / KİBRİTOTUGİLLER**

(3 cins + 6 tür)

**Lycopodiaceae** P.Beauv. ex Mirb., *Hist. Nat. Vég.* 4: 293 (1802) [*Lycopodia* olarak]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Lycopodium* L. (1753). – Lycopodiaceae.

Order B. **Isoëtales** Prantl, *Lehrb. Bot.*: 116 (1874).

**Family 2. Isoëtaceae** Reichenb., *Bot. Damen*: 309 (1828).

**2- ISOËTACEAE / ÇİMEĞRELTİSİGİLLER**

(1 cins + 5 tür)

**Isoëtaceae** Rchb., *Bot. Damen*: 309 (1828). – T: *Isoëtes* L. (1753). – Isoëtaceae.

Order C. **Selaginellales** Prantl, *Lehrb. Bot.*: 116 (1874).

**Family 3. Selaginellaceae** Willk., *Anleit. Stud. Bot.* 2: 163 (1854).

**3- SELAGINELLACEAE / SELAGİNGİLLER**

(1 cins + 2 tür)

**Selaginellaceae** Willk., *Anleit. Stud. Bot.* 2: 163 (1854). Almanca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Selaginella* P.Beauv., [*kor. ad / nom. cons.*] (1805). – Selaginellaceae.

**PTERIDOPHYTA / EĞRELTİ BÖLÜMÜ**

(29 cins + 89 tür [12 melez] + 6 alttür + 3 varyete)

**Pteridophyta** Schimp., *Handb. Palaeontol.* [K.A.Zittel] 2(1): 1 (1879). Almanca bir diyagnoz ile yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Pteris* L. (1753). – Pteridaceae.

Class/Sınıf: ?????

[ferns] Subclass: II **Equisetidae** Warm., *Osnov. Bot.*: 221 (1883).

**EQUISETIDAE / ATKUYRUĞU ALTSİNİFI**

(1 cins + 9 tür [1 melez])

**Equisetidae** Warm., *Osnov. Bot.*: 221 (1883), [*Equisetinae* olarak]. Almanca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Equisetum* L. (1753). – Equisetaceae.

Order D. **Equisetales** DC. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 271 (1820).

1 family.

**Family 4. Equisetaceae** Michx. ex DC., *Essai Propr. Méd. Pl.*: 49 (1804).

**4.1- EQUISETACEAE / ATKUYRUĞUGİLLER**

(1 cins + 9 tür [1 melez])

**Equisetaceae** Michx. ex DC., *Essai Propr. Méd. Pl.*: 49 (1804). G.F. Hoffmann'ın (Deutsch. Fl. 2: 2. 1796) verdiği ve Latince bir betimle birlikte doğru biçimde yayınladığı ancak uygun görülemeyen isme (*Peltata*), atıfta bulunularak yürürlüğe sokulmuştur. – Tip: *Equisetum* L. (1753). – Equisetaceae.



Class/Sınıf: ?????

Subclass: III **Ophioglossidae** Klinge, *Fl. Est.-Liv-Churland* 1: 94 (1882).  
*Psilotidae* Reveal, *Phytologia* 79: 70 (1996).

**Family 5. Ophioglossaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 438 (1820).

*Botrychiaceae* Horan., *Char. Ess. Fam.* 15 (1847).

*Helminthostachyaceae* Ching, *Bull. Fan Mem. Inst. Biol. Bot.* 10: 235 (1941).

5 genera (*Cheiroglossa*, *Botrychium*, *Helminthostachys*, *Mankyua*, *Ophioglossum*).

References: Hauk *et al.* (2003), Kato (1988), Sun *et al.* (2001), Wagner & Wagner (1983).

## 5.2- OPHIOGLOSSIDAE / DİLOTU ALTSINIFI

(2 cins + 3 tür)

**Ophioglossidae** Klinge, *Fl. Est.-Liv-Churland* 1: 94 (1882). Almanca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Ophioglossum* L. (1753). – Ophioglossaceae.

## OPHIOGLOSSACEAE / DİLOTUGİLLER (2 CİNS + 3 TÜR)

(2 cins + 3 tür)

**Ophioglossaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 438 (1820). – T: *Ophioglossum* L. (1753). – Ophioglossaceae.

Class/Sınıf: ?????

Subclass: V **Polypodiidae** Cronquist, Takht. & Zimmerm., *Taxon* 15: 133 (1966).

## POLYPODIIDAE / EĞRELTİ ALTSINIFI

(26 cins + 77 tür [11 melez] + 6 alttür + 3 varyete)

**Polypodiidae** Cronquist, Takht. & Zimmerm., *Taxon* 15: 133 (1966). Latince bir diyagnozla birlikte yayınlanan, [tasnif edilmemiş], *Gyratae* R.Br., *Prodr.*: 145 (1810), (*Gyratae* (*Polypodiaceae*))'ye doğrudan ve tam bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Polypodium* L. (1753). – Polypodiaceae.

Order H. **Osmundales** Link, *Hort. Berol.* 2: 138 (1833).

1 family.

**Family 8. Osmundaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 445 (1820).

## 6.3- OSMUNDACEAE / KIRALEĞRELTİSİĞİLLER (1 CİNS + 1 TÜR)

(1 cins + 1 tür)

**Osmundaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 445 (1820). A. Augier tarafından “Osmondoides” olarak (*Essai Nouv. Class. Vég.*: 33 [1801]), Fransızca bir betimle birlikte gerçek olarak yayınlanmış, ancak geçerli olmayan bir isme atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Osmunda* L. (1753). – Osmundaceae.

Order I. **Hymenophyllales** A.B.Frank in J.Leunis, *Syn. Pflanzenk., ed. 2, 3*: 1452 (1877).

1 family.

**Family 9. Hymenophyllaceae** Mart., *Consp. Regni Veg.*: 3 (1835).

*Trichomanaceae* Burmeister, *Handb. Naturgesch.*: 196 (1836).

## 7.4- HYMENOPHYLLACEAE / ZAREĞRELTİGİLLER

(1 cins + 1 tür)

**Hymenophyllaceae** Mart., *Consp. Regni Veg.*: 3 (1835). – T: *Hymenophyllum* Sm. (1793). – Hymenophyllaceae.

Order L. **Salviniales** Bartl. in Mart., *Consp. Regn. Veg.*: 4 (1835).

**Family 16. Marsileaceae** Mirb. in Lam. & Mirb., *Hist. Nat. Vég.* 5: 126 (1802).

**8.5- MARSILEACEAE / SUTIRFILİGİLLER**

(2 cins + 3 tür)

**Marsileaceae** Mirb., *Hist. Nat. Vég.* 5: 126 (1802). Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Marsilea L., [*kor. ad / nom. cons.*] (1753). – Marsileaceae.

**Family 17. Salviniaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 559 (1820).

*Azollaceae* Wettst., *Handb. Syst. Bot.* 2: 77 (1903).

**9.6- SALVINIACEAE / SUEĞRELTİSİGİLLER**

(2 cins + 2 tür)

**Salviniaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 559 (1820). Fransızca bir betimle birlikte verilen, doğru olarak yayınlanmış (A.W. Roth, *Fl. Franç.* [Lamarck ve de Candolle] 2: 577 [1805]), ama kabul edilemeyen bir ada atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Salvinia Ség. (1754). – Salviniaceae.

Sin.: *Azollaceae* Wettst., *Handb. Syst. Bot.* 2: 77 (1903).

Order N. **Polypodiales** Link, *Hort. Berol.* 2: 5 (1833).

*Filicales* Dumortier, *Anal. Fam. Pl.*: 67. 1829, *nom. illeg.*

**Family 30. Dennstaedtiaceae** Lotsy, *Votr. Bot. Stammesgesch.* 2: 655 (1909).

*Hypolepidaceae* Pic.Serm., *Webbia* 24: 705 (1970).

**10.7- DENNSTAEDTIACEAE / EĞRELTİGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Dennstaedtiaceae** Lotsy, *Votr. Bot. Stammesgesch.* 2: 655 (1909). Almanca bir diyagnoz ile yürürlüğe sokulmuştur. – T: Dennstaedtia Bernh. (1801). – Dennstaedtiaceae.

Sin.: *Hypolepidaceae* Pic.Serm., *Webbia* 24: 705 (1970). *Pteridiaceae* Ching, *Acta Phytotax.* Sin. 13: 96 (1975).

**Family 31. Pteridaceae** E.D.M.Kirchn., *Schul-Bot.*: 109 (1831).

*Adiantaceae* Newman, *Hist. Brit. Ferns*: 5 (1840), *nom. cons.*

*Sinopteridaceae* Koidz., *Acta Phytotax. Geobot.* 3: 50 (1934).

*Cryptogrammaeae* Pic.Serm., *Webbia* 17: 299 (1963).

*Cheilantheae* B.K.Nayar, *Taxon* 19: 233 (1970).

**11.8- PTERIDACEAE / BALDIRIKARAGİLLER**

(6 cins + 12 tür)

**Pteridaceae** E.D.M.Kirchn., *Schul-Bot.*: 109 (1831). Almanca bir diyagnoz ile yürürlüğe sokulmuştur. – T: Pteris L. (1753). – Pteridaceae.

Subfamily 31a. *Cryptogrammoideae* S.Linds. *Edinburgh J. Bot.* 66(2): 358. 2009

Subfamily 31c. *Pteridoideae* C.Chr. ex Crabbe, Jermy & Mickel, *Fern Gaz.* 11: 153 (1975).

*Taenitidoideae* (C.Presl) R.M.Tryon, *Amer. Fern J.* 76: 184 (1986).

Subfamily 31d. *Cheilantheae* W.C.Shieh, *J. Sci. Engin. (Nation. Chung-Hsing Univ.)* 10: 211 (1973).

Subfamily 31e. *Vittarioideae* (C.Presl) Crabbe, Jermy & Mickel, *Fern Gaz.* 11: 154 (1975).

*Adiantoideae* (C.Presl) R.M.Tryon, *Amer. Fern J.* 76: 184 (1986).

**ADIANTUM** L., *Sp. Pl.* 1094 (1753). / **BALDIRIKARA.** (1 tür)

**A. capillus-veneris** L., *Sp. Pl.* 2: 1096 (1753). / **baldirikara.**

**Family 32. Cystopteridaceae** Schmakov, *Turczaninowia* 4: 60 (2001).

## 12.9- CYSTOPTERIDACEAE / GEVREKEĞRELTİGİLLER

(2 cins + 4 tür)

**Cystopteridaceae** Schmakov, Turczaninowia 4: 60 (2001). “Cystopteridinae Payer, Bot. Crypt.: 198 (1850) (Cystopterideae)”ye doğrudan tam bir atıfla ve Latince bir diyagnozla birlikte yürürlüğe sokulmuştur. – T: Cystopteris Bernh. (1805). – Woodsiaceae.

### Family 33. Aspleniaceae Newman, *Hist. Brit. Ferns*: 6 (1840).

#### 13.10- ASPLENIACEAE / SAÇAKOTUGİLLER

(1 cins + 19 tür [3 melez])

**Aspleniaceae** Newman, *Hist. Brit. Ferns*: 6 (1840). İngilizce bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Asplenium L. (1753). – Aspleniaceae.

### Family 35. Thelypteridaceae Pic.Serm., *Webbia* 24: 709 (1970).

#### 14.11- THELYPTERIDACEAE / İFTERİGİLLER

(3 cins + 3 tür)

**Thelypteridaceae** Pic.Serm., *Webbia* 24: 709 (1970). Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Thelypteris Schmid., [*kor. ad / nom. cons.*], (1763). – Thelypteridaceae.

### Family 36. Woodsiaceae Herter, *Rev. Sudamer. Bot.* 9: 14 (1949).

#### 15.12- WOODSIACEAE / YAYLAĞRELTİSİGİLLER

(1 cins + 1 tür)

**Woodsiaceae** Herter, *Rev. Sudamer. Bot.* 9: 14 (1949). İlk olarak İngilizce bir diyagnozla birlikte yayınlanan (A. Gray, *Man. Bot.*, ed. 2: 588. 1 Sep 1856), ama daha sonra Almanca bir betim ve diyagnozla birlikte (Diels, *Nat. Pflanzenfam.* [Engler ve Prantl I, 4: 158, 159. 1899] doğru olarak yürürlüğe sokulan “Woodsiae” adına atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: Woodsia R.Br. (1810). – Woodsiaceae.

### Family 38. Onocleaceae Pic.Serm., *Webbia* 24: 708 (1970).

1(–4) genera: (*Onoclea*).

Reference: Gastony & Ungerer (1997).

Note:—The four genera (*Matteuccia*, *Onoclea*, *Onocleopsis* and *Pentarhizidium*) are very close and are here treated under the single genus *Onoclea*.

#### 16.13- ONOCLEACEAE / ŞAHEĞRELTİSİGİLLER

(1 cins + 1 tür)

**Onocleaceae** Pic.Serm., *Webbia* 24: 708 (1970). Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Onoclea L. (1753). – Onocleaceae.

### Family 39. Blechnaceae Newman, *Hist. Brit. Ferns*, ed. 2: 8 (1844).

#### 17.14- BLECHNACEAE / TARAĞRELTİSİGİLLER

(1 cins + 1 tür)

**Blechnaceae** Newman, *Hist. Brit. Ferns*, ed. 2: 8 (1844). İngilizce bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Blechnum L. (1753). – Blechnaceae.

### Family 40. Athyriaceae Alston, *Taxon* 5: 25 (1956).

#### 18.15- ATHYRIACEAE / YELEĞRELTİSİGİLLER

(1 cins + 2 tür)

**Athyriaceae** Alston, *Taxon* 5: 25 (1956). Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Athyrium Roth (1799). – Woodsiaceae.

### Family 42. Dryopteridaceae Herter, *Rev. Sudamer. Bot.* 9: 15 (1949), *nom. cons.*

*Aspidiaceae* Mett. ex A.B.Frank in Leunis, *Syn. Pflanzenk. ed. 2. 3:* 1469 (1877), *nom. illeg.*

*Filicaceae* Juss., *Gen. Pl.:* 14. (1789), as 'Filices', *nom. illeg., rej.*

Subfamily 42a. *Dryopteridoideae* B.K.Nayar, *Taxon* 19: 235 (1970).

#### 19.16- DRYOPTERIDACEAE / PİLUNÇGİLLER

(2 cins + 22 tür [6 melez] + 6 alttür + 1 varyete)

**Dryopteridaceae** Herter, *Rev. Sudamer. Bot.* 9: 15 (1949), [*kor. ad / nom. cons.*]. Gerçek ama yasal olmayan, Latince bir betimle yayınlanmış *Aspidiaceae* Baker ("C.F.P. von Martius, *Fl. Bras.* 1(2): 458, 1870" makalesinde) ve yine gerçek ama yasal olmayan, Almanca bir diyagnoz ile birlikte yayınlanmış *Aspidieae* Diels ("H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl, *Nat. Pflanzenfam. I, 4:* 158, 1899" makalesinde) isimlerine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Dryopteris* Adans., [*kor. ad / nom. cons.*] (1763). – *Dryopteridaceae*.

**Family 48. Polypodiaceae** J.Presl & C.Presl, *Delic. Prag.:* 159 (1822).

Subfamily 48e. *Polypodioideae* B.K.Nayar, *Taxon* 19: 234 (1970).

#### 20.17- POLYPODIACEAE / BENLİĞRELTİGİLLER

(1 cins + 4 tür [2 melez] + 2 varyete)

**Polypodiaceae** J.Presl & C.Presl, *Delic. Prag.:* 159 (1822). Gerçek bir yayınla ve Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuş, ama kabul edilemeyen *Filices* Juss. (*Gen. Pl.:* 14. 4 Aug 1789) adına (B.F.V. von Berchtold & J. Presl, *Prir. Rostlin:* 272. 1820) üzerinden dolaylı bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Polypodium* L. (1753). – *Polypodiaceae*.

## MAGNOLIOPHYTA / TOHURLU BİTKİLER

(1 cins + 4 tür [2 melez] + 2 varyete)

**Magnoliophyta** Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal in *Phytologia* 79: 70 (1996). Latince bir betimle birlikte yayınlanan, *Class Polycarpellae* C. Agardh, *Classes Pl.:* 13 (1825)'ye doğrudan ve tam bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Pinus* L. (1753). – *Pinaceae. (Gymnospermae)*.

**Linear sequence of extant gymnosperms and bibliography**

**Subfamily:**

#### PINOPHYTINA / AÇIK TOHURLULAR

(10 cins + 27 tür + 14 alttür + 15 varyete + 2 forma)

**Pinophytina** Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal, *Phytologia* 79: 70 (1996). Latince bir diyagnozla birlikte yayınlanan, *Class Coniferae* Bartl., *Ord. Nat. Pl.:* 90, 92 (1830)'ye doğrudan ve tam bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Pinus* L. (1753). – *Pinaceae. (Gymnospermae)*.

**Class/Sınıf: ?????**

**SUBCLASS I. CYCADIDAE** Pax in K.A.E.Prantl, *Lehrb. Bot. ed. 9:* 203 (1894).—T.:

*Cycadaceae*.

*Zamiidae* Doweld, *Tent. Syst. Pl. Vasc.:* xv (2001).—T.: *Zamiaceae*.

#### CYCADIDAE / AAAAÂ ALTSINIFI

**ORDER A. CYCADALES** Pers. ex Bercht. & J.Presl, *Prir. Rostlin:* 262 (1820).—T.:

*Cycadaceae*.

#### oo.o CYCADACEAE / AAAÂÂA

Class/Sınıf: ?????

**SUBCLASS II. GINKGOIDAE** Engl. in H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl, *Nat. Pflanzenfam. Nacht.*: 341 (1897).—T.: Ginkgoaceae.

**GINKGOIDAE / GİNKO/MABETAĞACI ALTSINIFI**

**ORDER B. GINKGOALES** Gorozh., *Lekts. Morf. Sist. Archegon.*: 73 (1904).—T.: Ginkgoaceae.

**Family 3. Ginkgoaceae** Engl. in H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl, *Nat. Pflanzenfam. Nachtr.*: 19 (1897), *nom. cons.*—T.: *Ginkgo* L.

**00.0- GİNKGOACEAE / MABETAĞACIGİLLER/DENİZÜZÜMÜGİLLER**

**3.1. Ginkgo** L., *Mant.* 2: 313 (1771).—T.: *G. biloba* L.

Class/Sınıf: ?????

**SUBCLASS III. GNETIDAE** Pax in K.A.E. Prantl, *Lehrb. Bot.*, ed. 9: 203 (1894).—T.: Gnetaceae. *Ephedridae* Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal, *Phytologia* 79: 69 (1996).—T.: Ephedraceae. *Welwitschiidae* Cronquist, Takht. & Zimmerm. ex Reveal, *Phytologia* 79: 71 (1996).—T.: Welwitschiaceae.

**GNETIDAE / DENİZÜZÜMÜ ALTSINIFI**

**(1 cins + 3 tür + 3 alttür)**

**Gnetidae** Pax, *Lehrb. Bot.* [Prantl], ed. 9: 203 (1894), (Gnetaceae). Almanca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Gnetum* L. (1767). – Gnetaceae.

**ORDER C. WELWITSCHIALES** Skotts. ex Reveal, *Phytologia* 74: 174 (1993).—T.: Welwitschiaceae.

**ORDER D. GNETALES** Blume in C.F.P. von Martius, *Consp. Regn. Veg.*: 11 (1835).—T.: Gnetaceae.

**ORDER E. EPHEDRALES** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 11 (1829).—T.: Ephedraceae.

**Family 6. Ephedraceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 11 (1829), *nom. cons.*—T.: *Ephedra* L.

**21.1- EPHEDRACEAE / DENİZÜZÜMÜGİLLER**

**(1 cins + 3 tür + 3 alttür)**

**Ephedraceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.* 11. (1829), [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Ephedra* L. (1753). – Ephedraceae.

**6.1 Ephedra** L., *Sp. Pl.* 2: 1040 (1753).—T.: *E. distachya* L.

Class/Sınıf: ?????

**SUBCLASS IV. PINIDAE** Cronquist, Takht. & Zimmerm., *Taxon* 15: 134 (1966).—T.: Pinaceae.

**PINIDAE / ÇAMLAR ALTSINIFI**

**(9 cins + 24 tür + 11 alttür + 15 varyete + 2 forma)**

**Pinidae** Cronquist, Takht. & Zimmerm., *Taxon* 15: 134 (1966). Latince bir diyagnozla birlikte, A.L. de Jussieu'nun (*Gen. Pl.*: 411. 4 Aug 1789, Fam. Coniferae olarak) gerçek şekilde yayınladığı ama kabul edilemeyen isme doğrudan ve tam bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur.—T: *Pinus* L. (1753). – Pinaceae.

oniferales etc.) should be avoided.

**ORDER F. PINALES** Gorozh., *Lekts. Morf. Sist. Archegon.*: 88 (1904).—T.: Pinaceae. *Abietales* Link, *Handbuch* 2: 474 (1829).—T.: *Abietaceae*.

**Family 7. Pinaceae** Spreng. ex F.Rudolphi, *Syst. Orb. Veg.*: 35 (1830), *nom. cons.*—T.: *Pinus* L.

**22.2- PINACEAE / ÇAMGİLLER**

**(5 cins + 14 tür + 7 alttür + 11 varyete)**

**Pinaceae** Spreng. ex F. Rudolphi, *Syst. Orb. Veg.*: 35 (1830), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Pinus* L. (1753). – Pinaceae.

**7.1. Cedrus** Trew, *Cedr. Lib. Hist., Apol. Mant.* 1: 6 (1757), *nom. cons.*, non Duhamel (1755, *nom. rej.*), non Mill. (1757, = *Cedrela* P.Browne, Meliaceae).—T.: *C. libani* A.Rich. (= *Pinus cedrus* L.)

**CEDRUS** Trew, *Cedr. Lib. Hist., Apol. Mant.* 1: 6 (1757), [*kor. ad / nom. cons.*]. / **SEDİR.** (1 tür + 1 varyete)

**7.2. Pinus** L., *Sp. Pl.* 2: 1000 (1753).—T.: *P. sylvestris* L.

**PINUS** L., *Sp. Pl.* 2: 1000 (1753). / **ÇAM.** (7 tür + 3 alttür + 10 varyete)

**7.4. Picea** A.Dietr., *Fl. Berlin* 1(2): 794 (1824).—T.: *P. rubra* A.Dietr., *nom. illeg.* (*Picea abies* (L.) H.Karst., = *Pinus abies* L.)

**PICEA** A.Dietr., *Fl. Geg. Berlin* 1(2): 794 (1824). / **LÂDİN.** (2 tür)

**7.5. Pseudotsuga** Carr., *Traité Conif.*, ed. 2: 256 (1867).—T.: *P. douglasii* (Sabine ex D.Don) Carr. (= *Pinus douglasii* Sabine ex D.Don) [correct name *P. menziesii* (Mirb.) Franco]

**\*PSEUDOTSUGA** Carriere, *Traité Gén. Conif.* (ed. 2) 1: 256 (1867). / **DUGLAS.** (1 tür)

**7.6. Larix** Mill., *Gard. Dict. Abr.*, ed. 4: [unpaged.] (1754).—T.: *L. decidua* Mill. (= *Pinus larix* L.)

**7.8. Tsuga** (Endl.) Carr., *Traité Conif.*: 185 (1855).—T.: *T. sieboldii* Carr. (= *Abies tsuga* Siebold & Zucc.)

**7.11. Abies** Mill., *Gard. Dict. Abr.*, ed. 4, vol. 1: [unpaged.] (1754).—T.: *A. alba* Mill. (= *Pinus picea* L.)

**ABIES** Mill., *Gard. Dict. Abr.*, ed. 4 (1754). / **GÖKNAR.** (3 tür + 4 alttür)

**ORDER G. ARAUCARIALES** Gorozh., *Lekts. Morf. Sist. Archegon.*: 72 (1904).—T.: Araucariaceae.

**ORDER H. CUPRESSALES** Link, *Handbuch* 2: 470 (1829).—T.: Cupressaceae.

**Family 11. Cupressaceae** Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 222. (1822), *nom. cons.*—T.:

*Cupressus* L.

*Cryptomeriaceae* Gorozh., *Lekts. Morf. Sist. Archegon.*: 88 (1904).—T.: *Cryptomeria* D.Don

**23.3- CUPRESSACEAE / SERVİGİLLER**

**(3 cins + 9 tür + 4 alttür + 4 varyete + 2 forma)**

**Cupressaceae** Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 222 (1822), [*kor. ad / nom. cons.*]. – İngilizce bir betim ve diyagnoz ile yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Cupressus* L. (1753). - Cupressaceae.

**11.7. *Cryptomeria*** D.Don, *Ann. Nat. Hist.* 1: 233 (1838).—T.: *C. japonica* (Thunb. ex L.f.) D.Don (≡ *Cupressus japonica* Thunb. ex L.f.)

\***CRYPTOMERIA** D.Don, *Ann. Nat. Hist.* 1: 233 (1838). / **KADİFEÇAMI. (1 tür)**

**11.24. *Cupressus*** L., *Sp. Pl.* 2: 1002 (1753).—T.: *C. sempervirens* L.

**CUPRESSUS** L., *Sp. Pl.* 2: 1002 (1753). / **SERVİ. (1 tür)**

**11.25. *Juniperus*** L., *Sp. Pl.* 2: 1038 (1753).—T.: *J. communis* L.

**JUNIPERUS** L., *Sp. Pl.* 2: 1038 (1753). / **ARDIÇ. (7 tür + 4 alttür + 4 varyete + 2 forma).**

**Family 12. Taxaceae** Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 222, 226 (1822), *nom. cons.*—T.: *Taxus* L.

**24.4- TAXACEAE / PORSUKGİLLER**

**(1 cins + 1 tür)**

**Taxaceae** Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 222 (1822), [“Taxideae” olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. İngilizce bir betim ve diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Taxus* L. (1753). – Taxaceae.

**12.3. *Taxus*** L., *Sp. Pl.* 2: 1040 (1753).—T.: *T. baccata* L.

**TAXUS** L., *Sp. Pl.* 2: 1040 (1753). / **PORSUK. (1 tür)**

## Catalogue of Names

Subfamily/ altfamilya:

**MAGNOLIOPHYTINA / KAPALI TOHUMLULAR**

**(1 cins + 4 tür [2 melez] + 2 varyete)**

Magnoliophytina Frohne & U.Jensen ex Reveal, *Phytologia* 79: 70 (1996). Latince bir diyagnozla birlikte yayımlanan, Class Polycarpellae C.Agardh, *Classes Pl.*: 13 (1825)'ye doğrudan ve tam bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Magnolia* L. (1753). – Magnoliaceae. (Angiospermae).

**Class/Sınıf: ??????**

**XIV. Magnoliidae** Novák ex Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 51. 4 Feb 1967

**MAGNOLIIDAE / MANOLYA ALTSINIFI**

Magnoliidae Novák ex Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 51. 4 Feb 1967. Latince bir diyagnozla birlikte yayımlanan, Class Polycarpellae C.Agardh, *Classes Pl.*: 13 (1825)'ye doğrudan ve tam bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Magnolia* L. (1753). – Magnoliaceae. (Birçenekliler [*Monocotyledonae*] ve İkiçenekliler [*Dicotyledonae*] dahildir.).

**Superorder/Üsttakım: A. Amborellanae** M.W.Chase & Reveal, *Bot. J. Linn. Soc.* 161: 123. 28 Oct 2009.

B. **Nymphaeanae** Thorne ex Reveal, *Novon* 2: 236. 13 Oct 1992.

2. **Nymphaeales** Salisb. ex Bercht. & J.Presl, *Př ir. Rostlin*: 270. Jan–Apr 1820.

4. **Nymphaeaceae** Salisb., *Ann. Bot. (König & Sims)* 2: 70. Jun 1805, *nom. cons.*

**25.1- NYMPHAEACEAE / NİLÜFERGİLLER**

(2 cins + 2 tür)

**Nymphaeaceae** Salisb., *Ann. Bot. (König & Sims)* 2: 70 (1805), [*Nymphaeëae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Nymphaea* L., [*kor. ad / nom. cons.*] (1753). – *Nymphaeaceae*.

D. **Magnolianae** Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 51. 4 Feb 1967

5. **Piperales** Bercht. & J.Presl, *Př ir. Rostlin*: 261. Jan–Apr 1820

11. **Piperaceae** Giseke, *Prael. Ord. Nat. Pl.*: 123. Apr 1792, *nom. cons.*

14. **Aristolochiaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 72. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**26.2- ARISTOLOCHIACEAE / LOHUSAOTUGİLLER**

(2 cins + 30 tür [2 melez])

**Aristolochiaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 72 (1789), (*Aristolochiae*), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Aristolochia* L. (1753). – *Aristolochiaceae*.

6. **Magnoliales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Př ir. Rostlin*: 223. Jan–Apr 1820

16. **Magnoliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 280. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**27.3-\*MAGNOLIACEAE / MANOLYAGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Magnoliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 280 (1789) [*Magnoliae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Magnolia* L. (1753). – *Magnoliaceae*.

7. **Laurales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Př ir. Rostlin*: 235. Jan–Apr 1820

27. **Lauraceae** Juss., *Gen. Pl.*: 80. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**28.4- LAURACEAE / DEFNEGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Lauraceae** Juss., *Gen. Pl.*: 80 (1789), [*Lauri* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Laurus* L. (1753). – *Lauraceae*.

E. **Liliana** Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 473. 4 Feb 1967

9. **Acorales** Mart., *Consp. Regn. Veg.*: 6. Sep–Oct 1835

29. **Acoraceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 6. 3 Aug 1820

**29.5-\*ACORACEAE / EĞİRGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Acoraceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 6 (1820). A. Augier'in (*Essai Nouv. Classif. Vég.*: 44, 45. 1801), Fransızca bir betimle birlikte gerçek olarak yayınladığı, ancak geçerli olmayan "Acoracées" ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Acorus* L. (1753). – *Acoraceae*.



10. **Alismatales** R.Br. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 271. Jan–Apr 1820

30. **Araceae** Juss., *Gen. Pl.*: 23. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

*Lemnaceae* Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 729. 10 Jan 1822, *nom. cons.*

**30.6- ARACEAE / YILANYASTIĞIGİLLER**

(9 cins + 38 tür + 3 alttür + 7 varyete)

**Araceae** Juss., *Gen. Pl.*: 23 (1789), [‘Aroideae’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Arum L. (1753). – Araceae.

Sin.: *Lemnaceae* Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 729 (1822), [*kor. ad / nom. cons.*].

32. **Alismataceae** Vent., *Tabl. Règne Vég.* 2: 157. 5 Mai 1799, *nom. cons.*

*Limnocharitaceae* Takht. ex Cronquist, *Integr. Syst. Class. Fl. Pl.*: 1048. 10 Aug 1981

**31.7- ALISMATACEAE / KURBAĞAKAŞIĞIGİLLER**

(4 cins + 7 tür + 1 alttür)

**Alismataceae** Vent., *Tabl. Règne Vég.* 2: 157 (1799), [‘Alismoideae’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Alisma L. (1753). – Alismataceae.

33. **Butomaceae** Mirb., *Hist. Nat. Pl.* 8: 194. 1804, *nom. cons.*

**32.8- BUTOMACEAE / BATAKLIKĞÜLÜĞİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Butomaceae** Mirb., *Hist. Nat. Pl.* 8: 194 (1804), [‘Butomi’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Butomus L. (1753). – Butomaceae.

34. **Hydrocharitaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 67. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

*Najadaceae* Juss., *Gen. Pl.*: 18. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

*Vallisneriaceae* Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 54, 55. 1829

**33.9- HYDROCHARITACEAE / KURBAĞAZEHİRİĞİLLER**

(7 cins + 10 tür + 2 alttür + 1 varyete)

**Hydrocharitaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 67 (1789), [‘Hydrocharideae’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Hydrocharis L. (1753). – Hydrocharitaceae.

Sin.: *Najadaceae* Juss.

37. **Juncaginaceae** Rich., *Démonstr. Bot.*: ix. Mai 1808, *nom. cons.*

**JUNCAGINACEAE / SUÇENGELİĞİLLER**

(1 cins + 3 tür)

**Juncaginaceae** Rich., *Démonstr. Bot.*: ix (1808), [‘Juncagines’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Juncago Ség. (1754). – Juncaginaceae.

38. **Zosteraceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 65, 66. 1829, *nom. cons.*

**ZOSTERACEAE / DENİZOTUĞİLLER**

(1 cins + 2 tür)

**Zosteraceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 65, 66 (1829), [**kor. ad / nom. cons.**]. Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Zostera L. (1753). – Zosteraceae.

39. **Potamogetonaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin* 1(7\*–13): 1, 3. 1823, *nom. cons.*

**POTAMOGETONACEAE / SUSÜMBÜLÜĞİLLER**

(5 cins + 19 tür [1 melez] + 4 alttür)

**Potamogetonaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin* 1(7\*–13): 1, 3 (1823), [‘Potamogetinae’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Çekçe bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Potamogeton L. (1753). – Potamogetonaceae.

Sin.: *Zannichelliaceae* Chevall., Fl. Gén. Env. Paris 2: 257 (1827), [kor. ad / nom. cons.].

40. **Posidoniaceae** Vines, *Stud. Text-book Bot.* 2: 553. Mar 1895, *nom. cons.*

**POSIDONIACEAE / ERİŞTEGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Posidoniaceae** Vines, *Stud. Text-book Bot.* 2: 553 (1895), [kor. ad / nom. cons.]. İngilizce bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Posidonia* K.D.Koenig, [kor. ad / nom. cons.] (1805). – *Posidoniaceae*.

41. **Ruppiaceae** Horan., *Prim. Lin. Syst. Nat.*: 46. 2 Nov 1834, *nom. cons.*

**RUPPIACEAE / ÖRDEKOTUGİLLER**

(1 cins + 2 tür)

**Ruppiaceae** Horan., *Prim. Lin. Syst. Nat.*: 46 (1834), [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Ruppia* L. (1753). – *Ruppiaceae*.

42. **Cymodoceaceae** Vines, *Stud. Text-book Bot.* 2: 553. Mar 1895, *nom. cons.*

**CYMODOCEACEAE / SUDÜGÜMÜGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Cymodoceaceae** Vines, *Stud. Text-book Bot.* 2: 553 (1895), [kor. ad / nom. cons.]. İngilizce bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Cymodocea* K.D.Koenig, [kor. ad / nom. cons.] (1805). – *Cymodoceaceae*.

12. **Dioscoreales** Mart., *Consp. Regn. Veg.*: 9. Sep–Oct 1835

44. **Nartheciaceae** Fr. ex Bjurzon, *Skandin. Växtfam.*: 64. 1846

**NARTHECIACEAE / DÜĞÜNVARGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Nartheciaceae** Fr. ex Bjurzon, *Skandin. Växtfam.*: 64 (1846). Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Narthecium* Huds., [kor. ad / nom. cons.] (1762). – *Nartheciaceae*.

46. **Dioscoreaceae** R.Br., *Prodr.*: 294. 27 Mar 1810, *nom. cons.*

**DIOSCOREACEAE / DOLANBAÇGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Dioscoreaceae** R.Br., *Prodr.*: 294 (1810), [*Dioscoreae* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Dioscorea* L., [kor. ad / nom. cons.] (1753). – *Dioscoreaceae*.

13. **Pandanales** R.Br. ex Bercht. & J.sl, *P ir. Rostlin*: 262. Jan–Apr 1820

14. **Liliales** Perleb, *Lehrb. Naturgesch. Pflanzenr.*: 129. Sep–Oct 1826

53. **Melanthiaceae** Batsch ex Borkh., *Bot. Wörterb.* 2: 8. 1797, *nom. cons.*

**MELANTHIACEAE / DOKUZTEPELİGİLLER**

(2 cins + 3 tür)

**Melanthiaceae** Batsch ex Borkh., *Bot. Wörterb.* 2: 8 (1797), [*Melanthia* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Melanthium* L. (1753). – *Melanthiaceae*.

56. **Colchicaceae** DC., *Essai Propr. Méd. Pl.*: 56. Jul 1804, *nom. cons.*

**COLCHICACEAE / ACIÇİĞDEMĞİLLER**

(1 cins + 47 tür + 5 alltür)

**Colchicaceae** DC., *Essai Propr. Méd. Pl.*: 56 (1804), (*Cochicaceae*), [kor. ad / nom. cons.] Kısa bir Fransızca betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Colchicum* L. (1753). – *Colchicaceae*.

59. **Smilacaceae** Vent., *Tabl. Règne Vég.* 2: 146. 5 Mai 1799, *nom. cons.*

**SMILACACEAE / DİKENUCUGİLLER**

(1 cins + 2 tür)

**Smilacaceae** Vent., *Tabl. Règne Vég.* 2: 146 (1799), [*'Smilaceae'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Smilax* L. (1753). – *Smilacaceae*.

61. **Liliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 48. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**LILIACEAE / ZAMBAKGİLLER**

(5 cins + 91 tür + 12 alttür + 8 varyete)

**Liliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 48 (1789), [*'Lilia'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Lilium* L. (1753). – *Liliaceae*.

15. **Asparagales** Link, *Handbuch* 1: 272. 4–11 Jul 1829

62. **Orchidaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 64. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**ORCHIDACEAE / SALEPGİLLER**

(26 cins [3 m] + 166 tür [43 m] + 85 alttür + 8 varyete)

**Orchidaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 64 (1789), (*Orchideae*), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Orchis* L. (1753). – *Orchidaceae*.

70. **Ixiolirionaceae** Nakai, *Chosakuronbun Mokuroku*  
[*Ord. Fam. Trib. Nov.*]: 234. 20 Jul 1943

**IXIOLIRIACEAE / KÖPEKOTUGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Ixioliriaceae** Nakai, *Chosakuronbun Mokuroku* [*Ord. Fam. Trib. Nov.*]: 234 (1943). Latince bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Ixiolirion* Herb. (1821). – *Ixioliriaceae* (*Ixiolirionaceae*).

71. **Iridaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 57. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**IRIDACEAE / SÜSENGİLLER**

(5 cins + 107 tür [2 m] + 63 alttür + 9 varyete + 1 forma)

**Iridaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 57 (1789), [*'Irides'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Iris* L. (1753). – *Iridaceae*.

73. **Xanthorrhoeaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 60, 62, 103. 1829, *nom. cons.*

*Asphodelaceae* Juss., *Gen. Pl.*: 51. 4 Aug 1789

**XANTHORRHOEACEAE / ÇİRİŞGİLLER**

(6 cins + 26 tür + 8 alttür + 3 varyete)

**Xanthorrhoeaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 60, 62, 103 (1829), [*'Xanthorhaeaceae'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Xanthorrhoea* Sm. (1798). – *Xanthorrhoeaceae*.

Sin.: *Asphodelaceae* Juss., *Gen. Pl.*: 51 (1789).

75. **Asparagaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 40. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

*Hyacinthaceae* Batsch ex Borkh., *Bot. Wörterb.* 1: 315. 1797

**ASPARAGACEAE / KUŞKONMAZGİLLER**

(19 cins + 183 tür [1 m] + 9 alttür + 3 varyete)

**Asparagaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 40 (1789), [*'Asparagi'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Asparagus* L. (1753). – *Asparagaceae*.

16. **Arecales** Bromhead, *Mag. Nat. Hist.*, n.s., 4: 333. Jul 1840

76. **Areaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 266. Jan–Apr 1820, *nom. cons.*, *nom. alt.*  
*Palmae* Juss., *Gen. Pl.*: 37. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**AREACEAE / PALMIYEGİLLER**

(7 cins + 11 tür)

**Areaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 266 (1820), [*kor. ad / nom. cons.*], [*diğ. ad / nom. alt.*:  
*Palmae*]. Çekçe bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Areca* L. (1753). – *Areaceae*.

17. **Commelinales** Mirb. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 267. Jan–Apr 1820

78. **Commelinaceae** Mirb., *Hist. Nat. Pl.* 8: 177. 1804, *nom. cons.*

**COMMELINACEAE / TELGRAFIÇEĞİGİLLER**

(2 cins + 4 tür)

**Commelinaceae** Mirb., *Hist. Nat. Pl.* 8: 177 (1804), [*‘Commelinae’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*].  
Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Commelina* L. (1753). – *Commelinaceae*.

78. **Pontederiaceae** Mirb., *Hist. Nat. Pl.* 8: 177. 1804, *nom. cons.*

**PONTEDERiaceAE / NİLSÜMBÜLÜGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Pontederiaceae** Kunth in F.W.H.A. von Humboldt, A.J.A. Bonpland & C.S. Kunth, *Nov. Gen. Sp.* 1, ed. qu.:  
265. 4-11 Mai 1816 [*(Pontedereae)*, *nom. cons.*]. Lâtinçe bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Pontederia*  
L. (1753). – *Pontederiaceae*

18. **Zingiberales** Griseb., *Grundr. Syst. Bot.*: 167. 1–2 Jun 1854

82. **Strelitziaceae** Hutch., *Fam. Fl. Pl.* 2: 72. 20 Jul 1934, *nom. cons.*

85. **Musaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 61. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**MUSACEAE / MUZGİLLER**

(1 cins + 1 tür + 1 alttür)

**Musaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 61 (1789), [*‘Musae’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle  
yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Musa* L. (1753). – *Musaceae*.

86. **Cannaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 62. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**\*CANNACEAE / KANAÇIÇEĞİGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Cannaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 62 (1789), [*‘Cannae’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle  
yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Canna* L. (1753). – *Cannaceae*.

20. **Poales** Small, *Fl. S.E. U.S.*: 48. 22 Jul 1903

91. **Typhaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 25. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

*Sparganiaceae* Hanin, *Cours Bot.*: 400. 16–23 Apr 1811, *nom. cons.*

**TYPHACEAE / SAZGİLLER**

(2 cins + 10 tür + 4 alttür [1 melez])

**Typhaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 25 (1789), [*‘Typhae’* olarak], [**kor. ad / nom. cons.**]. Latince bir betimle  
yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Typha* L. (1753). – *Typhaceae*.

98. **Juncaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 43. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**JUNCACEAE / KOFAGİLLER**

(2 cins + 49 tür [1 m] + 16 alttür)

**Juncaceae** Juss., Gen. Pl.: 43 (1789), ["*Junci*" olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Juncus* L. (1753). – Juncaceae.

99. **Cyperaceae** Juss., Gen. Pl.: 26. 4 Aug 1789, nom. cons.

**CYPERACEAE / HASIROTUGİLLER**

(21 cins + 165 tür + 66 alttür + 17 varyete)

**Cyperaceae** Juss., Gen. Pl.: 26 (1789), ['*Cyperoideae*' olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Cyperus* L. (1753). – Cyperaceae.

106. **Poaceae** Barnhart, Bull. Torrey Bot. Club 22: 7. 15 Jan 1895, nom. cons., nom. alt.

**Gramineae** Juss., Gen. Pl.: 28. 4 Aug 1789, nom. cons.

**POACEAE / BUĞDAYGİLLER**

(146 cins [2 m] + 553 tür [5 m] + 85 alttür + 49 varyete)

**Poaceae** Barnhart, Bull. Torrey Bot. Club 22: 7 (1895), [kor. ad / nom. cons.], [diğ. ad / nom. alt.: Gramineae]. İngilizce bir diyagnozla yayınlanmış olan "Poeae R.Br., M. Flinders" (Voy. Terra Austral. 2: 582, 1814), (Poaceae), ismine atf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Poa* L. (1753). – Poaceae.

F. **Ceratophyllanae** Takht. ex Reveal & Doweld, Novon 9: 549. 30 Dec 1999

21. **Ceratophyllales** Link, Handbuch 2: 406. 4–11 Jul 1829

107. **Ceratophyllaceae** Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 395, 554. 10 Jan 1822, nom. cons.

**CERATOPHYLLACEAE / SUBOYNUZUGİLLER**

(1 cins+ 2 tür)

**Ceratophyllaceae** Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 395, 554 (1822), (*Ceratophyllae*), [kor. ad / nom. cons.]. İngilizce bir diyagnoz ve betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Ceratophyllum* L. (1753). – Ceratophyllaceae.

G. **Ranunculanae** Takht. ex Reveal, Novon 2: 236. 13 Oct 1992

22. **Ranunculales** Juss. ex Bercht. & J. Presl, Přir. Rostlin: 215. Jan–Apr 1820

109. **Papaveraceae** Juss., Gen. Pl.: 235. 4 Aug 1789, nom. cons.

**Fumariaceae** Marquis, Esq. Règne Vég.: 50. 15–22 Jul 1820, nom. cons.

**PAPAVERACEAE / HAŞHAŞGİLLER**

(7 cins + 84 tür + 42 alttür + 11 varyete)

**Papaveraceae** Juss., Gen. Pl.: 235 (1789), [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Papaver* L. (1753). – Papaveraceae.

*Argemone mexicana* L., (Sp. Pl. 1: 508, 1753) ve *Eschscholzia californica* Cham. (Horae Phys. Berol. 74, 1820) süs bitkisi olarak yetiştirilmektedir.

113. **Berberidaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 286. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**BERBERIDACEAE / KARAMUKGİLLER**  
(4 cins + 9 tür + 1 alttür)

**Berberidaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 286 (1789), ['Berberides' olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Berberis L. (1753). – Berberidaceae.

114. **Ranunculaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 231. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**RANUNCULACEAE / DÜĞÜNÇİÇEĞİGİLLER**  
(20 cins + 203 tür + 41 alttür + 16 varyete)

**Ranunculaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 231 (1789), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Ranunculus L. (1753). – Ranunculaceae.

H. **Proteanae** Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 401. 4 Feb 1967

24. **Proteales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 234. Jan–Apr 1820

117. **Platanaceae** T.Lestib., *Botanogr. Elém.*: 526. 12–19 Jun 1826, *nom. cons.*

**PLATANACEAE / ÇINARGİLLER**  
(1 cins + 2 tür)

**Platanaceae** T.Lestib., *Botanogr. Elém.*: 526 (1826), ['*Platanées(-eae)*' olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Platanus L. (1753). – Platanaceae.

J. **Buxanae** Takht. ex Reveal & Doweld, *Novon* 9: 549. 30 Dec 1999

26. **Buxales** Takht. ex Reveal, *Phytologia* 79: 72. 29 Apr 1996

121. **Buxaceae** Dumort., *Comment. Bot.*: 54. Nov–Dec 1822, *nom. cons.*

**BUXACEAE / ŞİMŞİRGİLLER**  
(2 cins + 4 tür)

**Buxaceae** Dumort., *Comment. Bot.*: 54 (1822), [*kor. ad / nom. cons.*]. J.L.A. Loiseleur-Deslongchamps'in (Man. Pl. Usuell. 2: 495, 496, 1819), Fransızca bir betimle birlikte gerçek olarak yayınladığı, ancak geçerli olmayan "Buxacées" ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: Buxus L. (1753). – Buxaceae.

K. **Myrothamnanae** Takht., *Divers. Classif. Fl. Pl.*: 134. 24 Apr 1997

27. **Gunnerales** Takht. ex Reveal, *Novon* 2: 239. 13 Oct 1992

*Myrothamnales* Nakai ex Reveal, *Phytologia* 74: 176. 25 Mar 1993

122. **Gunneraceae** Meisn., *Pl. Vasc. Gen.*: Tab. Diagn. 345, 346, Comm. 257. 13–15 Feb 1842, *nom. cons.*

M. **Saxifraganae** Reveal, *Phytologia* 76: 4. 2 Mai 1994 [Note: this superorder was not recognized for the unplaced order Saxifragales in Chase & Reveal (2009), but we treat this order here so that it is clearly placed in the system, pending eventual resolution of their phylogenetic position.]

29. **Saxifragales** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 259. Jan–Apr 1820

126. **Paeoniaceae** Raf., *Anal. Nat.*: 176. Apr–Jul 1815, *nom. cons.*

**PAEONIACEAE / AYIGÜLÜGİLLER**

**Paeoniaceae** Raf., *Anal. Nat.*: 176 (1815), [*‘Peonidia’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Paeonia* L. (1753). – Paeoniaceae.

127. **Altingiaceae** Horan., *Osnov. Bot.*: 271. 1841, *nom. cons.*

**ALTINGIACEAE / GÜNLÜKAĞACIGİLLER**

(1 cins + 2 tür)

**Altingiaceae** Horan., *Osnov. Bot.*: 271 (1841), [*‘Balsamiifluae’*], [*kor. ad / nom. cons.*]. C.L. von Blume ve J.B. Fischer’in (*Fl. Javae* 17-18: 3. 1829), Latince bir betimle birlikte, gerçek biçimde yayınladığı ancak kabul edilemeyen isme [*‘Balsamiifluae’*] yapılan atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Altingia* Noronha (1790). – Altingiaceae.

128. **Hamamelidaceae** R.Br. in C. Abel, *Narr. Journey China*: 374. 15 Aug 1818, *nom. cons.*

132. **Grossulariaceae** DC. in J.B.A.P.M. de Lamarck & A.P. de Candolle, *Fl. Franç.*, ed. 3, 4(2): 405. 17 Sep 1805, *nom. cons.*

**GROSSULARIACEAE / BEKTAŞIÜZÜMÜGİLLER**

(1 cins + 8 tür + 1 alttür)

**Grossulariaceae** DC., *Fl. Franç.* [Lamarck & de Candolle], ed. 3, 4(2): 405 (1805), [*‘Grossulariae’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Grossularia* Mill. (1754). – Grossulariaceae.

133. **Saxifragaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 308. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**SAXIFRAGACEAE / TAŞKIRANGİLLER**

(2 cins + 22 tür + 5 alttür + 2 varyete)

**Saxifragaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 308 (1789), [*‘Saxifragae’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Saxifraga* L. (1753). – Saxifragaceae.

134. **Crassulaceae** J.St.-Hil., *Expos. Fam. Nat.* 2: 123. Feb–Apr 1805, *nom. cons.*

**CRASSULACEAE / DAMKORUĞUGİLLER**

(8 cins + 79 tür + 23 alttür + 6 varyete)

**Crassulaceae** J.St.-Hil., *Expos. Fam. Nat.* 2: 123 (1805), [*‘Crassuleae’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Crassula* L. (1753). – Crassulaceae.

138. **Haloragaceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 549. 19 Jul 1814, *nom. cons.*

## HALORAGACEAE / SUCİVANPERÇEMİĞİLLER

(1 cins + 2 tür)

**Haloragaceae** R.Br., *Voy. Terra Austral.* [M. Flinders] 2: 549 (1814), [*'Haloragaeae'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. İngilizce bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Haloragis* J.R.Forst. & G.Forst. (1775). – *Haloragraceae*.

N. **Rosanae** Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 264. 4 Feb 1967

31. **Vitales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 225. Jan–Apr 1820

140. **Vitaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 267. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

## VITACEAE / ASMAGİLLER

(2 cins + 4 tür)

**Vitaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 267 (1789), [*'Vites'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Vitis* L. (1753). – *Vitaceae*.

32. **Zygothylales** Link, *Handbuch* 2: 228. 4–11 Jul 1829

142. **Zygothylaceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 545. 19 Jul 1814, *nom. cons.*

## ZYGOPHYLLACEAE / ÇOBANÇÖKERTENGİLLER

(3 cins + 5 tür)

**Zygothylaceae** R.Br., *Voy. Terra Austral.* [M. Flinders] 2: 545 (1814), (*Zygothylaceae*), [*kor. ad / nom. cons.*]. A.L. de Jussieu'nun eserindeki (*Gen. Pl.*: 296, 1789) *Rutaceae*'nin isimlendirilmemiş ve mertebelenmemiş bir bölümüyle birlikteki Latince bir betime atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Zygothylum* L. (1753). – *Zygothylaceae*.

33. **Fabales** Bromhead, *Edinburgh New Philos. J.* 25: 126. Jul 1838

144. **Fabaceae** Lindl., *Edwards's Bot. Reg.* 22: ad t. 1845. 1 Apr 1836, *nom. cons.*, *nom. alt.*

**Caesalpinaceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 551. 19 Jul 1814, *nom. cons.*

**Leguminosae** Juss., *Gen. Pl.*: 345. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**Mimosaceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 551. 19 Jul 1814, *nom. cons.*

**Papilionaceae** Giseke, *Prael. Ord. Nat. Pl.*: 415. Apr 1792, *nom. cons.*, *nom. alt.*

## FABACEAE / BAKLAGİLLER

(71 cins + 1059 tür + 141 alttür + 156 varyete)

**Fabaceae** Lindl., *Nat. Syst. Bot.*, ed. 2: 148 (1836), [*kor. ad / nom. cons.*], [*diğ. ad / nom. alt.*]: *Leguminosae* veya *Papilionaceae*. İngilizce bir diyagnoz ile yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Faba* Mill., [*yasd. ad / nom. illeg.*], (1754: = *Vicia* L., 1753). – *Fabaceae*.

Sin.: *Leguminosae* Juss., *Gen. Pl.*: 345 (1789), [*kor. ad / nom. cons.*]. *Papilionaceae* Giseke, *Prael. Ord. Nat. Pl.*: 415 (1792), [*kor. ad / nom. cons.*], [*diğ. ad / nom. alt.*]. *Caesalpinaceae* R.Br., *Voy. Terra Austral.* 2: 551 (1814), [*kor. ad / nom. cons.*]. *Mimosaceae* R.Br., *Voy. Terra Austral.* 2: 551 (1814), [*kor. ad / nom. cons.*].

146. **Polygalaceae** Hoffmanns. & Link, *Fl. Portug.* 1: 62. 1 Sep 1809, *nom. cons.*

## POLYGALACEAE / SÜTOTUGİLLER



(1 cins + 17 tür + 4 alttür)

**Polygalaceae** Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 62 (1809), (*Polygalinae*), [kor. ad / nom. cons.]. Latince ve Fransızca diyağnozlarla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Polygala L. (1753). – Polygalaceae.

34. **Rosales** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 231. Jan–Apr 1820

147. **Rosaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 334. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**ROSACEAE / GÜLGİLLER**

(37 cins [1 m] + 203 tür [9 m] + 37 alttür + 41 varyete)

**Rosaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 334 (1789), [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Rosa L., [kor. ad / nom. cons.]. (1753). – Rosaceae.

150. **Elaeagnaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 74. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**ELAEAGNACEAE / İĞDEGİLLER**

(1 cins + 2 tür + 2 varyete)

**Elaeagnaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 74 (1789), [*Elaeagni* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Elaeagnus L. (1753). – Elaeagnaceae.

151. **Rhamnaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 376. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**RHAMNACEAE / CEHRİGİLLER**

(5 cins + 26 tür + 6 alttür)

**Rhamnaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 376 (1789), [*Rhamni* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Rhamnus L. (1753). – Rhamnaceae.

152. **Ulmaceae** Mirb., *Elém. Physiol. Vég. Bot.* 2: 905. 24–30 Jun 1815, *nom. cons.*

**ULMACEAE / KARAAĞAÇGİLLER**

(2 cins + 9 tür [1 m])

**Ulmaceae** Mirb., *Elém. Physiol. Vég. Bot.* 2: 905 (1815), [kor. ad / nom. cons.]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Ulmus L. (1753). – Ulmaceae.

153. **Cannabaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 99. 3 Aug 1820, *nom. cons.*

**CANNABACEAE / KENEVİRGİLLER**

(3 cins + 5 tür + 2 alttür)

**Cannabaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 99 (1820) [*Cannabinae* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. A. Augier'in (*Essai Nouv. Classif. Vég.*: 129, 132. 1801), Fransızca bir betimle birlikte gerçek olarak yayınladığı, ancak geçerli olmayan "Cannabines" ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: Cannabis L. (1753). – Cannabaceae.

154. **Moraceae** Gaudich. in C. B. Trinius, *Gen. Pl.*: 13. 1835, *nom. cons.*

**MORACEAE / DUTGİLLER**

(4 cins + 7 tür + 2 alttür)

**Moraceae** Gaudich., *Gen. Pl.* [C.B.Trinius]: 13 (1835), [kor. ad / nom. cons.]. C. Gaudichaud-Beaupré'in, H.L.C. de Saulces de Freycinet'in eserinde "Voy. Uranie, Bot.: 509 (1830)", Latince bir betimle birlikte gerçek biçimde yayınladığı ancak geçerli olmayan "Sect. Moreae" ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: Morus L. (1754). – Moraceae.

155. **Urticaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 400. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**URTICACEAE / ISIRGANGİLLER**

(2 cins + 9 tür + 3 alttür)

**Urticaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 400 (1789), [*Urticae* olarak], [k.muş / *nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Urtica* L. (1753). – Urticaceae.

35. **Fagales** Engl., *Syllabus*, ed. 1: 94. Apr 1892

157. **Fagaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 11, 12. 1829, *nom. cons.*

**FAGACEAE / KAYINGİLLER**

(3 cins + 27 tür [4 m] + 15 alttür)

**Fagaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 11, 12 (1829), [*Fagineae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Fagus* L. (1753). – Fagaceae.

159. **Juglandaceae** DC. ex Perleb, *Vers. Arzneikr. Pfl.*: 143. Mai 1818, *nom. cons.*

**JUGLANDACEAE / CEVİZGİLLER**

(2 cins + 2 tür)

**Juglandaceae** DC. ex Perleb, *Vers. Arzneikr. Pfl.*: 143 (1818), [*Juglandae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Almanca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Juglans* L. (1753). – Juglandaceae.

160. **Casuarinaceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 571. 19 Jul 1814, *nom. cons.*

**\*CASUARINACEAE / DEMİRAĞACIGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Casuarinaceae** R.Br., M.Flinders'in eserinde: "Voy. Terra Austral. 2: 571 (1814)", [*Casuarineae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. C.F.B. de Mirbel'in (Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. 16: 451. 1810), Fransızca bir betimle birlikte gerçek olarak yayınladığı, ancak geçerli olmayan "Casuarinées" ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Casuarina* Rumph. ex L. (1759). – Casuarinaceae.

162. **Betulaceae** Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 222, 243. 10 Jan 1822, *nom. cons.*

**Carpinaceae** Vest, *Anleit. Stud. Bot.*: 265, 280. 1818

**Corylaceae** Mirb., *Elém. Physiol. Vég. Bot.* 2: 906. 24–30 Jun 1815, *nom. cons.*

**BETULACEAE / HUŞGİLLER**

(5 cins + 12 tür + 5 alttür + 4 varyete)

**Betulaceae** Gray, *Nat. Arr. Brit. Pl.* 2: 222, 243 (1822), [*Betulideae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. İngilizce bir betim ve diyagnozla birlikte yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Betula* L. (1753). – Betulaceae.

Sin.: **Corylaceae** Mirb., *Elém. Physiol. Vég. Bot.* 2: 906 (1815). **Carpinaceae** Vest, *Anleit. Stud. Bot.*: 265, 280 (1818).

36. **Cucurbitales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 236. Jan–Apr 1820

163. **Apodanthaceae** Tiegh. ex Takht., *Sist. Magnolioph.* [*Syst. Magnolioph.*]: 42. 24 Jun 1987

**APODANTHACEAE / KIZILSAYAGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Apodanthaceae** Tiegh. ex Takht., Sist. Magnoliif. [Syst. Magnolioph.]: 42 (1987). Latince bir betimle birlikte yayınlanmış Dişi *Rafflesia*'nın (26 Eylül 1844) sonradan düzeltildiği ve aynı Latince betimle birlikte yayınlandığı *Apodantheae* R.Br.'ye (Trans. Linn. Soc. London 19: 246, 6 Kasım 1844) yapılan doğrudan ve tam bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Apodanthes* Poit. (1824). – *Rafflesiaceae*.

167. **Cucurbitaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 393. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**CUCURBITACEAE / KABAKGİLLER**

(9 cins + 17 tür)

**Cucurbitaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 393 (1789), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Cucurbita* L. (1753). – *Cucurbitaceae*.

169. **Datisceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 13, 14. 1829, *nom. cons.*

**DATISCEAE / RENKOTUGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Datisceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 13, 14 (1829), [*'Datisceae'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Datisca* L. (1753). – *Datisceae*.

170. **Begoniaceae** C.Agardh, *Aphor. Bot.*: 200. 13 Jun 1824, *nom. cons.*

37. **Celastrales** Link, *Handbuch* 2: 115. 4–11 Jul 1829

172. **Celastraceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 554. 19 Jul 1814, *nom. cons.*

*Parnassiaceae* Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 456. 3 Aug 1820, *nom. cons.*

**CELASTRACEAE / İĞAĞACIGİLLER**

(2 cins + 7 tür + 2 alttür)

**Celastraceae** R.Br., M. Flinders'in eserinde: "Voy. Terra Austral. 2: 554 (1814)", [*'Celastrinae'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Celastrus* L. [*kor. ad ve tip / nom. et typ. cons.*] (1753). – *Celastraceae*.

38. **Oxalidales** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 221. Jan–Apr 1820

175. **Oxalidaceae** R.Br. in J.H. Tuckey, *Narr. Exped. Zaire*: 433. 5 Mar 1818, *nom. cons.*

**OXALIDACEAE / EKŞİYONCAGİLLER**

(1 cins + 4 tür)

**Oxalidaceae** R.Br., *Observ. Congo*: 33 (1818), [*'Oxalideae'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. A.J.K.B. Batsch'ın (Tab. Affin. Regn. Veg.: 23, 1802), Latince bir betimle birlikte gerçek olarak yayınladığı ama kabul edilemeyen "*Sensitivae*" ismine atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Oxalis* L. (1753). – *Oxalidaceae*.

39. **Malpighiales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 225. Jan–Apr 1820

183. **Rafflesiaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 13, 14. 1829, *nom. cons.*

184. **Euphorbiaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 384. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**EUPHORBIACEAE / SÜTLEĞENGİLLER**

(5 cins + 111 tür + 23 alttür + 16 varyete)

**Euphorbiaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 384 (1789), [*'Euphorbiae'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir

betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Euphorbia L. (1753). – Euphorbiaceae.

189. **Phyllanthaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 369. 3 Aug 1820, *nom. cons.*

**PHYLLANTHACEAE / DUVARNOHUTUGİLLER**  
(2 cins + 3 tür)

**Phyllanthaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 369 (1820), [*Phyllanthoideae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. A. Augier'in (*Essai Nouv. Class. Vég.*: 44, 1801), Fransızca bir betimle birlikte "Phyllanthoïdes" olarak, gerçek olarak yayınladığı ama geçersiz bir isme atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: Phyllanthus L. (1753). – Phyllanthaceae.

190. **Elatinaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 44, 49. 1829, *nom. cons.*

**ELATINACEAE / SUSOLUCANOTUGİLLER**  
(1 cins + 3 tür)

**Elatinaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 44, 49 (1829), [*Elatinideae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Elatine L. (1753). – Elatinaceae.

199. **Passifloraceae** Juss. ex Roussel, *Fl. Calvados*, ed. 2: 334. 30 Mai 1806, *nom. cons.*

201. **Salicaceae** Mirb., *Elém. Physiol. Vég. Bot.* 2: 905. 24–30 Jun 1815, *nom. cons.*

**SALICACEAE / SÖĞÜTGİLLER**  
(2 cins + 45 tür [5 m] + 8 alttür + 6 varyete + 1 forma)

**Salicaceae** Mirb., *Elém. Physiol. Vég. Bot.* 2: 905 (1815), [*Salicineae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Salix L., [*kor. ad / nom. cons.*] (1753). – Salicaceae.

202. **Violaceae** Batsch, *Tab. Affin. Regni Veg.*: 57. 2 Mai 1802, *nom. cons.*

**VIOLACEAE / MENEKŞEGİLLER**  
(1 cins + 32 tür + 5 alttür)

**Violaceae** Batsch, *Tab. Affin. Regni Veg.*: 57 (1802), (*Violariae*), [**kor. ad / nom. cons.**]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Viola L. (1753). – Violaceae.

208. **Linaceae** DC. ex Perleb, *Vers. Arzneikr. Pfl.*: 107. Mai 1818, *nom. cons.*

**LINACEAE / KETENGİLLER**  
(2 cins + 43 tür + 18 alttür + 6 varyete)

**Linaceae** DC. ex Perleb, *Vers. Arzneikr. Pfl.*: 107 (1818), [*Lineae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Almanca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Linum L. (1753). – Linaceae.

211. **Clusiaceae** Lindl., *Nat. Syst. Bot.*, ed. 2: 74. 13 Jun 1836, *nom. cons.*, *nom. alt.*  
*Guttiferae* Juss., *Gen. Pl.*: 255. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

214. **Hypericaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 254. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**HYPERICACEAE / KANTARONGİLLER**  
(1 cins + 96 tür + 9 alttür + 11 varyete + 1 forma)

**Hypericaceae** Juss., Gen. Pl.: 254 (1789), [*'Hyperica'* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Hypericum L. (1753). – Hypericaceae.

40. **Geraniales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 221. Jan–Apr 1820

215. **Geraniaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 268. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**GERANIACEAE / TURNAGAGASIGİLLER**

(3 cins + 67 tür + 11 alttür)

**Geraniaceae** Juss., Gen. Pl.: 268 (1789), [*'Gerania'* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Geranium L. (1753). – Geraniaceae.

41. **Myrtales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 233. Jan–Apr 1820

219. **Lythraceae** J.St.-Hil., *Expos. Fam. Nat.* 2: 175. Feb–Apr 1805, *nom. cons.*

**Punicaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin* 2(94\*): 378. 1825, *nom. cons.*

**Trapaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 36, 39. 1829, *nom. cons.*

**LYTHRACEAE / AKLAROTUGİLLER**

(5 cins + 16 tür)

**Lythraceae** J.St.-Hil., *Expos. Fam. Nat.* 2: 175 (1805), [*'Lythraeae'* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Lythrum L. (1753). – Lythraceae.

Sin.: **Punicaceae** Bercht. & J.Presl, *Poir. Rostlin* 2(94\*): 378 (1825), [kor. ad / nom. cons.]. **Trapaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 36, 39 (1829), [kor. ad / nom. cons.].

220. **Onagraceae** Juss., *Gen. Pl.*: 317. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**ONAGRACEAE / YAKIOTUGİLLER**

(4 cins + 28 tür + 8 alttür)

**Onagraceae** Juss., Gen. Pl.: 317 (1789), [*'Onagrae'* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Onagra Mill., [*yasd. ad / nom. illeg.*] (1754: = Oenothera L., 1753). – Onagraceae.

222. **Myrtaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 322. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**MYRTACEAE / MERSİNGİLLER**

(2 cins + 3 tür + 2 alttür)

**Myrtaceae** Juss., Gen. Pl.: 322 (1789), [*'Myrti'* olarak], [kor. ad / nom. cons.] Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Myrtus L. (1753). – Myrtaceae.

230. **Staphyleaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 598. 3 Aug 1820, *nom. cons.*

**STAPHYLEACEAE / AĞIZLIKÇALISIGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Staphyleaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 598 (1820), [*'Staphyleae'* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. A. Augier'in (*Essai Nouv. Class. Vég.*: 207, 211, 1801), Fransızca betimlerle birlikte gerçek biçimde yayınladığı ama geçerli olmayan "*Staphyliars*" ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: Staphylea L. (1753). – Staphyleaceae.

44. **Sapindales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 224. Jan–Apr 1820

235. **Biebersteiniaceae** Schnizl., *Anal. Nat. Ordn. Gew.:* 14. 1856

**BIEBERSTEINIACEAE / İSTANGOZAGİLLER**

(1 cins + 2 tür)

**Biebersteiniaceae** Schnizl., *Anal. Nat. Ordn. Gew.:* 14 (1856), [‘Biebersteinieae’ olarak]. Latince betimle birlikte yayınlanmış, mertebelenmemiş Biebersteinieae Endl. (*Ench. Bot.:* 618, 1841) ismine doğrudan ve tam bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Biebersteinia Steph. (1806). – Biebersteiniaceae.

236. **Nitrariaceae** Lindl., *Intr. Nat. Syst. Bot.:* 149. 27 Sep 1830

**NITRARIACEAE / ÜZERLİKGİLLER**

(3 cins + 3 tür)

**Nitrariaceae** Lindl., *Intr. Nat. Syst. Bot.:* 149 (1830). İngilizce bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Nitraria L. (1759). – Nitrariaceae.

239. **Anacardiaceae** R.Br. in J.H. Tuckey, *Narr. Exped. Zaire:* 431. 5 Mar 1818, *nom. cons.*

**ANACARDIACEAE / MENENĞİÇGİLLER**

(3 cins + 10 tür [1 m] + 1 alttür)

**Anacardiaceae** R.Br., *Narr. Exped. Zaire* [J.H.Tuckey]: 431 (1818), [‘Cassuviae’ (veya ‘Anacardeae’) olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. İngilizce bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Anacardium L. (1753). – Anacardiaceae.

240. **Sapindaceae** Juss., *Gen. Pl.:* 246. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**Aceraceae** Juss., *Gen. Pl.:* 250. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**Hippocastanaceae** A.Rich., *Bot. Méd.:* 680. Jun 1823, *nom. cons.*

**SAPINDACEAE / AKÇAĞAÇGİLLER**

(3 cins + 14 tür + 17 alttür)

**Sapindaceae** Juss., *Gen. Pl.:* 246 (1789), [‘Sapindi’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Sapindus L. [*kor. ad / nom. cons.*] (1753). – Sapindaceae.

241. **Rutaceae** Juss., *Gen. Pl.:* 296. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**RUTACEAE / TURUNÇGİLLER**

(4 cins + 25 tür)

**Rutaceae** Juss., *Gen. Pl.:* 296 (1789), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Ruta L. (1753). – Rutaceae.

242. **Simaroubaceae** DC., *Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 2:* 209. Jan 1811, *nom. cons.*

**\*SIMAROUBACEAE / KOKARAĞAÇGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Simaroubaceae** DC., *Nouv. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 2:* 209 (1811), [‘Simarubeae’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Simarouba Aubl. [*kor. ad / nom. cons.*] (1775). – Simaroubaceae.

243. **Meliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 263. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**\*MELIACEAE / TESPIHAĞACIGİLLER**

**(1 cins + 1 tür)**

**Meliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 263 (1789), [*'Meliae'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Melia* L. (1753). – *Meliaceae*.

46. **Malvales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 221. Jan–Apr 1820

248. **Cytinaceae** A.Rich. in J.B.G.M. Bory de Saint-Vincent, *Dict. Class. Hist. Nat.* 5: 301. 15 Mai 1824

**CYTINACEAE / YERNARIGİLLER**

**(1 cins + 2 tür + 1 alttür)**

**Cytinaceae** A.Rich., *Dict. Class. Hist. Nat.* [J.B.G.M.Bory de Saint-Vincent], 5: 301 (1824), [*'Cytineae'* olarak]. Latince bir betimle birlikte yayınlanmış (*Ann. Sci. Nat.* [Paris] 1: 39, 1824), [mertebelendirilmemiş] '*Cytinae* Brongn.' adına yapılan atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Cytinus* L., [*kor. ad / nom. cons.*] (1764). – *Cytinaceae*.

251. **Malvaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 271. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**Tiliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 289. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**MALVACEAE / EBEGÜMECİGİLLER**

**(14 cins + 54 tür + 5 alttür)**

**Malvaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 271 (1789), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Malva* L. (1753). – *Malvaceae*.

Sin.: *Tiliaceae* Juss., *Gen. Pl.*: 289 (1789), [*kor. ad / nom. cons.*].

253. **Thymelaeaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 76. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**THYMELAEACEAE / SIYIRCIKGİLLER**

**(3 cins + 21 tür + 10 alttür)**

**Thymelaeaceae** Endl., *Gen. Pl. Suppl.* 4(2): 59, 61 (1848), [*'Thymelinae'* olarak]. Latince bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Thymelaea* Mill., [*kor. ad / nom. cons.*] (1754). – *Thymelaeaceae*.

256. **Cistaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 294. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**CISTACEAE / LADENGİLLER**

**(4 cins + 34 tür + 3 alttür)**

**Cistaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 294 (1789), [*'Cisti'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Cistus* L. (1753). – *Cistaceae*.

47. **Brassicales** Bromhead, *Edinburgh New Philos. J.* 24: 416. Apr 1838

271. **Resedaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 541. 3 Aug 1820, *nom. cons.*

**RESEDACEAE / GERDANLIKGİLLER**

**(1 cins + 16 tür + 4 alttür + 7 varyete)**

**Resedaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 541 (1820), [*kor. ad / nom. cons.*] A. Augier'in (*Essai Nouv. Class. Vég.*: 58, 69, 1801), Fransızca bir diyagnozla birlikte gerçek biçimde yayınladığı ancak geçerli olmayan "*Résédacées*" ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Reseda* L. (1753). – *Resedaceae*.

272. **Capparaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 242. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**CAPPARACEAE / KEBEREGİLLER**

(1 cins + 5 tür + 2 alttür)

**Capparaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 242 (1789), [*Capparides*' olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle birlikte yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Capparis* L. (1753). – Capparaceae.

273. **Cleomaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin* 2(64): 253. 1825

**CLEOMACEAE / SAÇAKGÜLÜGİLLER**

(1 cins + 3 tür)

**Cleomaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin* 2(64): 253 (1825). Çekçe bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Cleome* L. (1753). – Cleomaceae.

274. **Brassicaceae** Burnett, *Outl. Bot.*: 854, 1093, 1123. Feb 1835, *nom. cons.*, *nom. alt. Cruciferae* Juss., *Gen. Pl.*: 237. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**BRASSICACEAE / TURPGİLLER**

(98 cins + 604 tür [2 m] + 100 alttür + 34 varyete)

**Brassicaceae** Burnett, *Outl. Bot.*: 854, 1093, 1123 (1835), [*kor. ad / nom. cons.*], [diğ. ad / *nom. alt.*: *Cruciferae*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Brassica* L. (1753). – Brassicaceae.  
Sin.: *Siliquosae* L., (1753). *Cruciferae* Juss., (1789).

O. **Berberidopsidanae** Thorne & Reveal, *Bot. Rev. (Lancaster)* 73: 93. 29 Jun 2007

P. **Santalanae** Thorne ex Reveal, *Novon* 2: 236. 13 Oct 1992

**Balanophoranae** R.Dahlgren ex Reveal, *Novon* 2: 235. 13 Oct 1992

49. **Santalales** R.Br. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 234. Jan–Apr 1820

280. **Santalaceae** R.Br., *Prodr.*: 350. 27 Mar 1810, *nom. cons.*

**SANTALACEAE / GÜVELEKGİLLER**

(6 cins + 23 tür + 4 alttür)

**Santalaceae** R.Br., *Prodr. Fl. Nov. Holland*: 350 (1810), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Santalum* L. (1753). – Santalaceae.

281. **Loranthaceae** Juss., *Ann. Mus. Natl. Hist. Nat.* 12: 292. 1808, *nom. cons.*

**LORANTHACEAE / ARDIÇBURCUGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Loranthaceae** Juss., *Ann. Mus. Natl. Hist. Nat.* 12: 292 (1808), (*Loranthae*), [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Loranthus* Jacq., [*kor. ad / nom. cons.*], (1762). – Loranthaceae.



Q. Caryophyllanae Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 144. 4 Feb 1967

50. **Caryophyllales** Juss. ex Bercht. & J.Pröschl, *Přir. Rostlin*: 239. Jan–Apr 1820

284. **Frankeniaceae** Desv. in S. Gérardin de Mirecourt & N.A. Desvaux, *Dict. Rais. Bot.*: 188. 12–19 Apr 1817, *nom. cons.*

**FRANKENIACEAE / TÜLPEMBEGİLLER**

(1 cins + 3 tür)

**Frankeniaceae** Desv., S. Gérardin de Mirecourt & N.A. Desvaux'nun eserinde: “*Dict. Rais. Bot.*: 188 (1817)”, [*Frankenieae*’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. A. Saint-Hilaire’in (*Mém. Mus. Hist. Nat.* 2: 123, 1815), Fransızca bir diyagnozla birlikte gerçek olarak yayınladığı, ancak geçerli olmayan “*Frankéniacées*” ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Frankenia* L. (1753). – Frankeniaceae.

285. **Tamaricaceae** Link, *Enum. Hort. Berol. Alt.* 1: 291. 16 Mar–30 Jun 1821, *nom. cons.*

**TAMARICACEAE / ILGINGİLLER**

(3 cins + 11 tür)

**Tamaricaceae** Link, *Enum. Hort. Berol. Alt.* 1: 291 (1821), [*Tamariscinae*’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Tamarix* L. (1753). – Tamaricaceae.

286. **Plumbaginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 92. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**PLUMBAGINACEAE / KARDİKENİGİLLER**

(7 cins + 82 tür + 10 alttür + 21 varyete)

**Plumbaginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 92 (1789), [*Plumbagines*’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Plumbago* L. (1753). – Plumbaginaceae.

287. **Polygonaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 82. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**POLYGONACEAE / MADIMAKGİLLER**

(10 cins + 86 tür [8 m] + 22 alttür + 2 varyete)

**Polygonaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 82 (1789), [*Polygoneae*’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Polygonum* L., [*kor. ad / nom. cons.*] (1753). – Polygonaceae.

288. **Droseraceae** Salisb., *Parad. Lond.* 2: ad t. 95. 1 Feb 1808, *nom. cons.*

**DROSERACEAE / BÖCEKKAPANGİLLER**

(1 cins + 3 tür + 1 alttür)

**Droseraceae** Salisb., *Parad. Lond.* 2: ad t. 95 (1808), [*Drosereae*’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir diyagnoz ve betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Drosera* L. (1753). – Droseraceae.

297. **Caryophyllaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 299. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**Illecebraceae** R.Br., *Prodr.*: 413. 27 Mar 1810, *nom. cons.*

**CARYOPHYLLACEAE / KARANFİLGİLLER**

(36 cins + 560 tür [1 m] + 121 alttür + 73 varyete)

**Caryophyllaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 299 (1789), [*Caryophylleae*’ olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Caryophyllus* Mill., [*yasd. ad / nom. illeg.*]. – Caryophyllaceae.

Sin.: *Illecebraceae* R.Br., Prodr.: 413 (1810).

299. **Amaranthaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 87. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Chenopodiaceae* Vent., *Tabl. Règne Vég.* 2: 253. 5 Mai 1799, *nom. cons.*

**AMARANTHACEAE / HOROZİBİĞİLLER**

(33 cins + 133 tür [2 m] + 12 alttür + 10 varyete)

**Amaranthaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 87 (1789), [*'Amaranthi'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Amaranthus* L. (1753). – *Amaranthaceae*.

Sin.: *Chenopodiaceae* Vent.

305. **Aizoaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 15. 3 Aug 1820, *nom. cons.*

**\*AIZOACEAE / MAKASOTUGİLLER**

(2 cins + 3 tür)

**Aizoaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 15 (1820), [*'Aizoonides'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. A. Augier'in (*Essai Nouv. Classif. Vég.*: 129, 137. 1801), Fransızca bir betimle birlikte gerçek olarak yayınladığı, ancak geçerli olmayan "Aizoonides" ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Aizoon* L. (1753). – *Aizoaceae*.

306. **Phytolaccaceae** R.Br. in J.H. Tuckey, *Narr. Exped. Zaire*: 454. 5 Mar 1818, *nom. cons.*

**PHYTOLACCACEAE / ŞEKERCİBOYASIGİLLER**

(1 cins + 2 tür)

**Phytolaccaceae** R. Br., *Observ. Congo*: 33 (1818), [*'Phytolaceae'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. İngilizce bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Phytolacca* L. (1753). – *Phytolaccaceae*.

308. **Nyctaginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 90. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**\*NYCTAGINACEAE / BEGONVİLGİLLER**

(2 cins + 3 tür)

**Nyctaginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 90 (1789), [*'Nyctagines'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Nyctago* Juss., [*yasd. ad / nom. illeg.*], (1789; *Mirabilis* L., 1753). – *Nyctaginaceae*.

309. **Molluginaceae** Bartl. in F.G. Bartling & H.L. Wendland, *Beitr. Bot.* 2: 158. Dec 1825, *nom. cons.*

*Telephiaceae* Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 633. 3 Aug 1820

**MOLLUGINACEAE / HALİOTUGİLLER**

(3 cins + 4 tür + 1 alttür)

**Molluginaceae** Bartl., şu eserde: "F.G. Bartling & H.L. Wendland, *Beitr. Bot.* 2: 158 (1825)", [*'Mollugineae'* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Mollugo* L. (1753). – *Molluginaceae*.

310. **Montiaceae** Raf., *Ann. Gén. Sci. Phys. Bruxelles* 5: 349. Jul–Sep 1820

## MONTIACEAE / MONTİYAGİLLER

(1 cins + 2 tür + 1 alttür)

**Montiaceae** Raf., Ann. Gén. Sci. Phys. Bruxelles 5: 349 (1820), (*Montidia*). Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Montia* L. (1753). – Portulacaceae.

### 315. **Portulacaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 312. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

#### PORTULACACEAE / SEMİZOTUGİLLER

(1 cins + 8 tür)

**Portulacaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 312 (1789), (*Portulacaeae*), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Portulaca* L. (1753). – Portulacaceae.

### 317. **Cactaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 310. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

#### \*CACTACEAE / KAKTÜSGİLLER

(1 cins + 1 tür)

**Cactaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 310 (1789), [*‘Cacti’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Cactus* L., [*red. ad / nom. rej.*] (1753). – Cactaceae.

### R. **Asteranae** Takht., *Sist. Filog. Cvetk. Rast.*: 451. 4 Feb 1967

#### 51. **Cornales** Link, *Handbuch* 2: 2. 4–11 Jul 1829

#### 321. **Cornaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin* 2(23\*): 91, 92. 1825, *nom. cons.*

#### CORNACEAE / KIZILCIKGİLLER

(1 cins + 2 tür + 4 alttür [1 m])

**Cornaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin* 2(23\*): 91, 92 (1825), [*kor. ad / nom. cons.*]. Çekçe bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Cornus* L. (1753). – Cornaceae.

**CORNUS** L., *Sp. Pl.* 1: 117 (1753). / **KIZILCIK**.

**C. mas** L., *Sp. Pl.* 1: 117 (1753). / **kızılcık**.

**C. sanguinea** L., *Sp. Pl.* 117 1753. / **kiren**.

subsp. **australis** (C.A.Mey.) Jáv., *Magyar Növ. Kéz.* 1: 398 (1951). / **kansığdiren**.

subsp. **cilicica** (Wangerin) D.F.Chamb., *Fl. Turkey* 4: 540 1972. / **demircik**.

subsp. **x czerniaewii** Grosset, *Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol., n.s.*, 63(4): 78 (1958). (*C. sanguinea* subsp. *australis* × subsp. *sanguinea*). / **melez kızcık**.

subsp. **sanguinea**. / **kiren**.

### 322. **Hydrangeaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 36, 38. 1829, *nom. cons.*

#### HYDRANGEACEAE / ORTANCAGİLLER

(2 cins + 3 tür)

**Hydrangeaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 36, 38 (1829), [*kor. ad / nom. cons.*]. Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Hydrangea* L. (1753). – Hydrangeaceae.

### 52. **Ericales** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 251. Jan–Apr 1820

#### 324. **Balsaminaceae** A.Rich. in J.B.G.M. Bory de Saint-Vincent, *Dict. Class. Hist. Nat.* 2: 173. 31 Dec 1822, *nom. cons.*

#### BALSAMINACEAE / KINAÇIÇEĞİGİLLER

(1 cins + 2 tür)

**Balsaminaceae** A.Rich., “J.B.G.M.Bory de Saint-Vincent”ın eserinde, *Dict. Class. Hist. Nat.* 2: 173 (1822), [‘Balsamineae’ olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Balsamina* Mill. (1754). – *Balsaminaceae*.

328. **Polemoniaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 136. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**POLEMONIACEAE / MIZRAKOTUGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Polemoniaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 136 (1789), (*Polemonia*), [kor. ad / nom. cons.] Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Polemonium* L. (1753). – *Polemoniaceae*.

333. **Ebenaceae** Gürke in H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl, *Nat. Pflanzenfam.* IV, 1: 153. Dec 1892, *nom. cons.*

**EBENACEAE / ABANOZGİLLER**

(1 cins + 2 tür)

**Ebenaceae** Gürke, *Nat. Pflanzenfam.* [H.G.A. Engler ve K.A.E. Prantl] IV, 1: 153 (1892), [kor. ad / nom. cons.]. Almanca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Ebenus* Burm. ex Kuntze (1891). – *Ebenaceae*.

334. **Primulaceae** Batsch ex Borkh., *Bot. Wörterb.* 2: 240. 1797, *nom. cons.*

**PRIMULACEAE / ÇUHAÇİÇEĞİGİLLER**

(10 cins + 45 tür [1 m] + 10 alttür + 5 varyete)

**Primulaceae** Batsch ex Borkh., *Bot. Wörterb.* 2: 240 (1797), [‘*Primulae*’ olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Primula* L. (1753). – *Primulaceae*.

335. **Theaceae** Mirb. ex Ker Gawl., *Bot. Reg.* 2: ad t. 112. 1 Mai 1816, *nom. cons.*  
*Camelliaceae* DC., *Essai Propr. Méd. Pl.*, ed. 2: 97. 11 Mai 1816

**\*THEACEAE / ÇAYGİLLER**

(1 cins + 1 tür + 1 varyete)

**Theaceae** Mirb. ex Ker Gawl., *Bot. Reg.* 2: ad t. 112 (1816), [kor. ad / nom. cons.]. A.L. de Jussieu’dan alınmış (*Gen. Pl.*: 262, 1789) isimlendirilmemiş bir takson için yapılan kısa bir Latince betim ve İngilizce diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Thea* L. (1753). – *Theaceae*.

338. **Styracaceae** DC. & Spreng. [transl. Jameson], *Elem. Philos. Pl.*: 140. Jul 1821, *nom. cons.*

**STYRACACEAE / AYIFINDIĞIGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Styracaceae** DC. & Spreng., *Elem. Philos. Pl.*: 140 (1821) [‘*Styracaceae*’ olarak], [kor. ad / nom. cons.]. C.P.J. Sprengel’in (*Anleit. Kenntn. Gew.*, ed. 2, 2(2): 505, 1818), Almanca bir diyagnozla birlikte gerçek biçimde yayınladığı ancak geçerli olmayan “*Styraceen*” ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Styrax* L. (1753). – *Styracaceae*.

341. **Actinidiaceae** Engl. & Gilg, *Syllabus*, ed. 9–10: 279. 6 Nov 1924, *nom. cons.*  
*Saurauiaceae* Griseb., *Grundr. Syst. Bot.*: 98. 1–2 Jun 1854, *nom. cons.*

345. **Ericaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 159. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Empetraceae* Hook. & Lindl. in W.J. Hooker, *Fl. Scot.*: 297. 10 Mai 1821, *nom. cons.*  
*Monotropaceae* Nutt., *Gen. N. Amer. Pl.* 1: 272. 14 Jul 1818, *nom. cons.*  
*Pyrolaceae* Lindl., *Syn. Brit. Fl.*: 175. 16 Mar 1829, *nom. cons.*

**ERICACEAE / FUNDAGİLLER**  
(13 cins + 33 tür [5 m] + 3 alttür)

**Ericaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 159 (1789), [*Ericae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Erica* L. (1753). – Ericaceae.  
Sin.: *Empetraceae* Hook. & Lindl., *Fl. Scot.*: 297 (1821), [*kor. ad / nom. cons.*].

57. **Gentianales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 248. Jan–Apr 1820  
*Rubiales* Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 256. Jan–Apr 1820  
351. **Rubiaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 196. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Theligonaceae* Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 15, 17. 1829, *nom. cons.*

**RUBIACEAE / KÖKBOYAGİLLER**  
(13 cins + 172 tür + 45 alttür + 8 varyete + 2 forma)

**Rubiaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 196 (1789), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur.  
– T: *Rubia* L. (1753). – Rubiaceae.

352. **Gentianaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 141. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**GENTIANACEAE / GENTİYANGİLLER**  
(8 cins + 29 tür + 15 alttür)

**Gentianaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 141. 4 Aug 1789 (*Gentianae*), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Gentiana* L. (1753). – Gentianaceae.

355. **Apocynaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 143. 4 Aug 1789, *nom. cons.*  
*Asclepiadaceae* Borkh., *Bot. Wörterb.* 1: 31. 1797, *nom. cons.*

**APOCYNACEAE / ZAKKUMGİLLER**  
(11 cins + 22 tür + 10 alttür + 2 varyete)

**Apocynaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 143 (1789), (*Apocineae*), [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Apocynum* L. (1753). – Apocynaceae.  
Sin.: *Asclepiadaceae* Borkh., *Bot. Wörterb.* 1: 31 (1797).

59. **Boraginales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 244. Jan–Apr 1820 [Note: in Chase & Reveal (2009),

ř

Boraginaceae were unplaced to order, but we treat them here as an order to keep their place in the system.]

357. **Boraginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 128. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**BORAGINACEAE / HODANGİLLER**  
(44 cins + 343 tür [1 m] + 38 alttür + 29 varyete)

**Boraginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 128 (1789), [*Borragineae* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Borago* L. (1753). – Boraginaceae.  
Sin.: *Hydrophyllaceae* R.Br., *Bot. Reg.* 3: ad t. 242 (1817), [*kor. ad / nom. cons.*].

60. **Solanales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 243. Jan–Apr 1820

358. **Convolvulaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 132. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

*Cuscutaceae* Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 20, 25. 1829, *nom. cons.*

**CONVOLVULACEAE / TARLASARMAŞIĞIGİLLER**

(6 cins + 61 tür [3 m] + 16 alttür + 6 varyete)

**Convolvulaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 132 (1789), [*‘Convolvuli’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*] Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Convolvulus* L. (1753). – *Convolvulaceae*.

359. **Solanaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 124. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**SOLANAECIAE / PATLICANGİLLER**

(14 cins + 46 tür + 1 varyete)

**Solanaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 124 (1789), [*‘Solanae’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur – T: *Solanum* L. (1753). – *Solanaceae*.

61. **Lamiales** Bromhead, *Mag. Nat. Hist.*, ser. 2, 2: 210. Apr 1838

365. **Oleaceae** Hoffmanns. & Link, *Fl. Portug.* 1: 62. 1 Sep 1809, *nom. cons.*

**OLEACEAE / ZEYTINGİLLER**

(7 cins + 13 tür + 8 alttür)

**Oleaceae** Hoffmanns. & Link, *Fl. Portug.* 1: 62 (1809), [*‘Oleinae’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince ve Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Olea* L. (1753). – *Oleaceae*.

367. **Calceolariaceae** Olmstead in R.G. Olmstead *et al.*, *Amer. J. Bot.* 88: 357. 23 Feb 2001

368. **Gesneriaceae** Rich. & Juss. in A.P. de Candolle, *Essai Propr. Méd. Pl.*, ed. 2: 192. 11 Mai 1816, *nom. cons.*

369. **Plantaginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 89. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

*Callitrichaceae* Link, *Enum. Hort. Berol. Alt.* 1: 7. 16 Mar–30 Jun 1821, *nom. cons.*

*Globulariaceae* DC. in J.B.A.P.M. de Lamarck & A.P. de Candolle, *Fl. Franç.*, ed. 3, 3: 427. 17 Sep

1805, *nom. cons.*

*Hippuridaceae* Vest, *Anleit. Stud. Bot.*: 265, 278. 1818, *nom. cons.*

**PLANTAGINACEAE / SİNİROTUGİLLER**

(18 cins + 182 tür [1 m] + 58 alttür + 8 varyete)

**Plantaginaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 89 (1789), [*‘Plantagines’* olarak], [*kor. ad / nom. cons.*]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Plantago* L. (1753). – *Plantaginaceae*.

Sin.: *Callitrichaceae* Link, *Enum. Hort. Berol. Alt.* 1: 7 (1821), [*kor. ad / nom. cons.*]. *Globulariaceae* DC., *Fl. Franç.*, ed. 3, 3: 427 (1805), [*kor. ad / nom. cons.*]. *Hippuridaceae* Vest, *Anleit. Stud. Bot.*: 265, 278 (1818), [*kor. ad / nom. cons.*].

370. **Scrophulariaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 117. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

*Buddlejaceae* K.Wilh., *Samenpflanzen*: 90. Oct 1910, *nom. cons.*

**SCROPHULARIACEAE / SIRACAOTUGİLLER**

(4 cins + 407 tür [105 m] + 14 alttür + 58 varyete)

**Scrophulariaceae** Juss., Gen. Pl.: 117 (1789), [*Scrophulariae* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Scrophularia L. (1753). – Scrophulariaceae.

372. **Linderniaceae** Borsch, K.Müll. & Eb.Fisch., *Pl. Biol. (Stuttgart)* 7: 76. 28 Jan 2005

**LINDERNIACEAE / KUTUOTUGİLLER**

(1 cins + 2 tür)

**Linderniaceae** Borsch, K.Müll. & Eb.Fisch., *Pl. Biol. (Stuttgart)* 7: 76 (2005). Latince bir diyagnozla birlikte yayınlanmış Linderniaceae Rchb. “*Fl. Germ. Excurs.* 1(3): 385 (1831), (Linderniaceae)”, ismine tam ve doğrudan bir atıfla yürürlüğe sokulmuştur. – T: Lindernia All. (1766). – Linderniaceae.

373. **Pedaliaceae** R.Br., *Prodr.*: 519. 27 Mar 1810, *nom. cons.*

**\*PEDALIACEAE / SUSAMGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Pedaliaceae** R.Br., *Prodr.*: 519 (1810), (*Pedaliniae*), [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Pedalium D.Royen ex L. (1759). – Pedaliaceae.

374. **Lamiaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 355. 3 Aug 1820, *nom. cons.*, *nom. alt.*  
*Labiatae* Juss., *Gen. Pl.*: 110. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**LAMIACEAE / BALLIBABAGİLLER**

(46 cins + 608 tür [22 m] + 191 alttür + 42 varyete)

**Lamiaceae** Martinov, *Tekhno-Bot. Slovar*: 355 (1820), (*Lamieae*), *nom. cons.*, *nom. alt.*: Labiatae. A. Augier’in (*Essai Nouv. Class. Vég.*: 98, 1801) Fransızca bir betimle birlikte, gerçek olarak yayınlanmış ancak geçerli olmayan “Lamiées” ismine atıf yapılarak yürürlüğe sokulmuştur. – T: Lamium L. (1753). – Lamiaceae.

375. **Phrymaceae** Schauer in A.P. de Candolle & A.L.P.P. de Candolle, *Prodr.* 11: 520. 25 Nov 1847, *nom. cons.*

**PHRYMACEAE / DİLİGÜZELGİLLER**

(1 cins + 1 tür)

**Phrymaceae** Schauer, *Prodr.* 11: 520 (1847), [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Phryma L. (1753). – Phrymaceae.

376. **Paulowniaceae** Nakai, *J. Jap. Bot.* 24: 13. Dec 1949

377. **Orobanchaceae** Vent., *Tabl. Règne Vég.* 2: 292. 5 Mai 1799, *nom. cons.*

**OROBANCHACEAE / CANAVAROTUGİLLER**

(20 cins + 87 tür + 12 alttür + 2 varyete)

**Orobanchaceae** Vent., *Tabl. Règne Vég.* 2: 292 (1799), [*Orobanchoidae* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Orobanche L. (1753). – Orobanchaceae.

378. **Lentibulariaceae** Rich. in P.A. Poiteau & P.J.F. Turpin, *Fl. Paris* 1: ed. fol.: 23, ed. qu.: 26. 18 Jan 1808, *nom. cons.*

**LENTIBULARIACEAE / SUMİĞFERİGİLLER**

(2 cins + 6 tür + 1 alttür)

**Lentibulariaceae** Rich., Fl. Paris [P.A.Poiteau & P.J.F.Turpin] 1: ed. fol.: 23, ed. qu.: 26 (1808), [*Lentibulariae* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Lentibularia* Ség. (1754). – Lentibulariaceae.

379. **Acanthaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 102. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**ACANTHACEAE / AYIPENÇESİGİLLER**

(1 cins + 4 tür + 2 alttür + 4 varyete)

**Acanthaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 102 (1789), [*Acanthi* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Acanthus* L. (1753). – Acanthaceae.

380. **Bignoniaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 137. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**\*BIGNONIACEAE / KATALPAGİLLER**

(2 cins + 2 tür)

**Bignoniaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 137 (1789), [*Bignoniae* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Bignonia* L., [kor. ad / nom. cons.], (1753). – Bignoniaceae.

383. **Verbenaceae** J.St.-Hil., *Expos. Fam. Nat.* 1: 245. Feb–Apr 1805, *nom. cons.*

**VERBENACEAE / MİNEÇİÇEĞİGİLLER**

(3 cins + 5 tür + 1 varyete)

**Verbenaceae** J.St.-Hil., *Expos. Fam. Nat.* 1: 245 (1805), [kor. ad / nom. cons.]. Fransızca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Verbena* L. (1753). – Verbenaceae.

62. **Aquifoliales** Senft, *Lehrb. Forstl. Bot.*: 2: 118. 1856

390. **Aquifoliaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 2(110): 438, 440. 1825, *nom. cons.*

**AQUIFOLIACEAE / İŞILGANGİLLER**

(1 cins + 2 tür)

**Aquifoliaceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 2(110): 438, 440 (1825), [kor. ad / nom. cons.]. Çekçe bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Aquifolium* Mill., [yasd. ad / nom. illeg.] (1754). – Aquifoliaceae.  
Sin.: *Ilicaceae* Dumort., *Comment. Bot.*: 59 (1822).

63. **Asterales** Link, *Handbuch* 1: 731. 4–11 Jul 1829

**Campanulales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 253. Jan–Apr 1820

392. **Campanulaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 163. 4 Aug 1789, *nom. cons.*

**Lobeliaceae** Juss. in A.J.A. Bonplond, *Descr. Pl. Malmaison*: 19, t. 7. 17–24 Sep 1813, *nom. cons.*

**CAMPANULACEAE / ÇANÇİÇEĞİGİLLER**

(8 cins + 159 tür + 42 alttür + 8 varyete)

**Campanulaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 163 (1789), [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Campanula* L. (1753). – Campanulaceae.

398. **Menyanthaceae** Dumort., *Anal. Fam. Pl.*: 20, 25. 1829, *nom. cons.*

**MENYANTHACEAE / SUYONCASIGİLLER**



(2 cins + 2 tür)

**Menyanthaceae** Dumort., Anal. Fam. Pl.: 20, 25 (1829), [*'Menyanthideae'* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Fransızca bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Menyanthes* L. (1753). – Menyanthaceae.

401. **Asteraceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 254. Jan–Apr 1820, nom. cons., nom. alt.

*Compositae* Giseke, *Prael. Ord. Nat. Pl.*: 538. Apr 1792, nom. cons.

**ASTERACEAE / PAPATYAGİLLER**

(137 cins + 1325 tür [14 m] + 261 alttür + 94 varyete)

**Asteraceae** Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 254 (1820), [*'Astereae'* olarak], [kor. ad / nom. cons.], [diğ. ad / nom. alt.: *Compositae*]. Çekçe bir diyagnozla yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Aster* L. (1753). – Asteraceae.

67. **Dipsacales** Juss. ex Bercht. & J.Presl, *Přir. Rostlin*: 255. Jan–Apr 1820

406. **Adoxaceae** E.Mey., *Preuss. Pfl.-Gatt.*: 198. 1–7 Sep 1839, nom. cons.

*Sambucaceae* Batsch ex Borkh., *Bot. Wörterb.* 2: 322. 1797, nom. cons. prop.

*Viburnaceae* Raf., *Ann. Gén. Sci. Phys. Bruxelles* 6: 87. Oct–Dec 1820, nom. cons. prop.

**ADOXACEAE / MÜRVERGİLLER**

(2 cins + 6 tür)

**Adoxaceae** E.Mey., *Preuss. Pfl.-Gatt.*: 198 (1839), [*'Adoxeae'* olarak], [kor. ad / nom. cons.]. Almanca bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Adoxa* L., [kor. ad / nom. cons.] (1753). – Adoxaceae.

407. **Caprifoliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 210. 4 Aug 1789, nom. cons.

*Dipsacaceae* Juss., *Gen. Pl.*: 194. 4 Aug 1789, nom. cons.

*Morinaceae* Raf., *Ann. Gén. Sci. Phys. Bruxelles* 6: 88. Oct–Dec 1820

*Valerianaceae* Batsch, *Tab. Affin. Regni Veg.*: 227. 2 Mai 1802, nom. cons.

**CAPRIFOLIACEAE / HANIMELİGİLLER**

(12 cins + 158 tür [1 m] + 9 alttür + 16 varyete)

**Caprifoliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 210 (1789), [*'Caprifolia'* olarak], [kor. ad / nom. cons.] Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Caprifolium* Mill., [*yasd. ad / nom. illeg.*] (1754, =*Lonicera* L., 1753). – Caprifoliaceae.

Sin.: *Dipsacaceae* Juss., *Gen. Pl.*: 194 (1789), [kor. ad / nom. cons.]. *Morinaceae* Raf., *Ann. Gén. Sci. Phys. Bruxelles* 6: 88 (1820). *Valerianaceae* Batsch, *Tab. Affin. Regni Veg.*: 227 (1802), [kor. ad / nom. cons.].

68. **Apiales** Nakai, *Hisi-Shokubutsu*: 58. 1930

411. **Pittosporaceae** R.Br. in M. Flinders, *Voy. Terra Austral.* 2: 542. 19 Jul 1814, nom. cons.

412. **Araliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 217. 4 Aug 1789, nom. cons.

**ARALIACEAE / SARMAŞIKGİLLER**

(2 cins + 5 tür + 2 forma)

**Araliaceae** Juss., *Gen. Pl.*: 217 (1789), (*Araliae*), [kor. ad / nom. cons.]. Latince bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: *Aralia* L. (1753). – Araliaceae.

414. **Apiaceae** Lindl., *Nat. Syst. Bot.*, ed. 2: 21. 13 Jun 1836, nom. cons., nom. alt.  
*Umbelliferae* Juss., *Gen. Pl.*: 218. 4 Aug 1789, nom. cons.

**APIACEAE / MAYDANOZGİLLER**

**(101 cins + 478 tür + 41 alttür + 17 varyete)**

**Apiaceae** Lindl., Nat. Syst. Bot., ed. 2: 21 (1836), (Umbelliferae veya Apiaceae), [*kor. ad, diğ. ad / nom. cons., nom. alt.*]: Umbelliferae. İngilizce bir betimle yürürlüğe sokulmuştur. – T: Apium L. (1753). – Apiaceae.